федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРОЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 3

Специальность <u>31.08.47 Рефлексотерапия</u> *код, наименование* 

Кафедра: медицинской реабилитации

Форма обучения: очная

## 1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по практике «Производственная (клиническая) практика 3» является неотъемлемым приложением к рабочей программе практики «Производственная (клиническая) практика 3». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной практике.

#### 2. Перечень оценочных средств

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по практике Производственная (клиническая) практика 3 используются следующие оценочные средства:

№ п/ п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Кейс-задания	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	решения кейс- задания

## 3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и видов оценочных средств

Код и формулировка компетенции	Этап формировани я компетенции	Контролируемые разделы практики	Оценочные средства
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК- 8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12	Текущий	Раздел 1. «Организация работы рефлексотерапевтического отделения многопрофильного лечебного учреждения» Раздел 2. «Изучение и проведение классических и совре-менных методов и способов рефлекторного воздействия на биологи-ческие активные точки и зоны.» Раздел 3. «Назначение рефлексотерапевтических процедур больным неврологического профиля» Раздел 4. «Назначение рефлексотерапевтических процедур больным хирургического профиля, а также в травматологии и ортопедии» Раздел 5. «Назначение рефлексотерапевтических процедур больным терапевтических процедур больным терапевтических профиля и в гериатрии» Раздел 6 «Назначение рефлексотерапевтического профиля и в гериатрии» Раздел 6 «Назначение рефлексотерапевтических процедур в педиатрии»	Кейс-задания

ПК-1, ПК-2,	Промежуточ	Все разделы практики	Кейс-
ПК-3, ПК-4, ПК-	ный		задание
5, ПК-6, ПК-7,			
ПК-8, ПК-9, ПК-			
10, ПК-11, ПК-			
12			

#### 4. Содержание оценочных средств входного, текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем практики при проведении занятий в форме кейс заданий.

4.1. Кейс-задания для оценки компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12

Γ	ТК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12		
ВК и о Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса дд		Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса	
F			
Ī	_	001	
F	С		
q	/ 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
Þ	C / 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями	
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	
7	-	У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие после еды.	
E	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.	
(')	-	Задачи рефлексотерапии: купирование боли, воспаления, улучшение трофики.	
F 2	-	Задачи перечислены в полном объеме.	
F 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P	-	Задачи перечислены неверно.	
L			
F	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.	
(')	-	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических	

		активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.;
		<u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
p		
2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P 1	1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа.  Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
(')	1	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при купировании болевого синдрома, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, зона небольшой гиперемии вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).
P 2		Способы воздействия указаны верно и подробно.
P 1		Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
(1)	1	Используют точки каналов: <u>толстой кишки</u> (GI-4), <u>желудка</u> (E-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); <u>селезенки—поджелудочной железы</u> (RP-6, 16), <u>мочевого пузыря</u> (V-19, 21), <u>перикарда</u> (MC-6), <u>«трех обогревателей»</u> (TR-6), <u>желчного пузыря</u> (VB-24), <u>переднесрединного</u> (J-12, 13, 14).
P 2	- 1	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.
Ü	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной

Г		раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь),
		85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
L		
ŀ	- C	002
đ	/ 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
d	C / 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
7	_	Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, легкой степени тяжести. Жалобы: слабость, раздражительность, головные боли, снижение внимания, нарушение сна.
F	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
(')	-	Задачи рефлексотерапии: оказать гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P 2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P 1	_	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P 0	-	Задачи перечислены неверно.
F	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
	-	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме

P 1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно
E		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
(1)	1	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при нормализации АД, сна, улучшения настроения, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.
E	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
(1)	-	Используют точки каналов: <u>желудка</u> (Е-36), <u>толстого кишечника</u> (GI-11 <u>), селезенки—поджелудочной железы</u> (RP-6), <u>сердца</u> (С-7), <u>перикарда</u> (МС-6,7), <u>мочевого пузыря</u> (V-15,25), <u>желчного пузыря</u> (VB-20,21), <u>печени</u> (F-13), <u>переднесрединного</u> (J-14,17), <u>заднесрединного</u> (T-14,20,24).
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
F	$\vdash$	Пополните одновните одновните одновните доном (на може 4) може се
Е	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
(1)	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 13 (надпочечник), 19 (гипертония), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэеь), 59 (снижвющая артериальное даление), 72 <sup>1</sup> (завиток 1), 78 (верхушка уха), 105 (снижающая артериальное давление, вторая)
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.

P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
F		
Ļ		002
Ŀ	-	003
đ	C / 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
þ	C / 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
7	-	Пациент 46 лет. Д-3: Ожирение III степени алиментарно-конституциональное, андроидный тип с развернутой симптоматикой метаболического синдрома. Жалобы: избыточный вес, одышка при физической нагрузке, быстрая утомляемость, раздражительность.
L		
F	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
(')	-	Задачи рефлексотерапии: липолитическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P 2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P 0	-	Задачи перечислены неверно.
L	L	
E	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
(1)	-	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотера-пия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
P 2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
F 1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно
	_	

В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
(1)	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
1 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
9	-	Используют точки каналов: <u>переднесрединного</u> (J-4), <u>печени</u> (F-13), <u>мочевого пузыря</u> (V-20, 23, 43); <u>легких</u> (P-7), <u>селезенки-поджелудочной железы</u> (RP-1, 2, 3, 4, 6); <u>почек</u> (R-3, 6); <u>«трех обогревателей»</u> (TR-4, 5), <u>желудка</u> (E-33, 36, 45), <u>перикарда</u> (MC6),
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P 0	1	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
(1)	ı	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 17 (жажда), 18 (голода), 22 (железы внутренней секреции), 26а (придаток мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэнь), 95 (почка), .96 (поджелудочная жедеза), 97 (печень), 122 (панкреатит).
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P 1	ı	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
F		004
-	C	001
đ	/ 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

4	C / 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
7	-	Пациент 65 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя люмбалгия, мышечно-тонические проявления, выраженный болевой синдром. Жалобы: боли в пояснице слева, усиливающиеся при движении, ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, слабость, раздражительность, плохой сон.
E	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
(')	-	Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
P 2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P 0	-	Задачи перечислены неверно.
L		Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в
E	• /	лечении денного заболевания.
(1)		В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия и др
P 2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P 1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно
Ε	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
(1)	-	При выраженной боли – I вариант тормозного метода: иглы вводят медленно, глубоко, до появления выраженных предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, выраженная зона гиперемии вокруг иглы, используют 2-3 БАТ, время постановки игл 40 – 60 минут и более. При некотором стихании боли используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления

		предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.
		При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.
F		
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
(1)	1	Используют точки каналов: мочевого пузыря (V-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 67); желчного пузыря (VB-30, 34, 39); желудка (E-36, 41, 44); заднесрединного (T-2, 4); тонкой кишки (IG-3), толстой кишки (GI-4). Для выполнения правила «верх—низ», а по другим теориям, чтобы «блокировать» каналы, используют точки V-11, 41, 60; T-14.
P 2	- 1	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P 1	1	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
(C)	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 40 (поясничный отдел позвлночника), 38 (крестцовый отдел позвоночника), 54 (люмбалгия), 53 (ягодица), 29 (затылок). На ухе можно оставлять микроиглы на 2—3 дня.
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P 0	1	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
L		
E	<u>-</u>	005
đ	C / 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

_	_	_	
	(	C	
		/	
(	1	n	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
	٦,	<u>,                                    </u>	пазна тение рефлексотерании национтам с заоблеваниями и (или) состояниями.
	4	۷.	
	ľ	8	
ı	Ť		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА
I	4		вопросы
ŀ	+		
			Пациент 47 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя цервикобрахиалгия, мышечно-
			тонические проявления, умеренно выраженный болевой синдром.
1	y		Жалобы на боль в шейном отделе позвоночника слева с иррадиацией в левую руку.
			Ограничение движений в шейном отделе позвоночника. Раздражительность,
			1 ,
L	+		бессонница.
L			
Ţ,	Ţ	, ]	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической
μ	1	11	ситуации.
ŀ	$\dagger$		Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое,
r	Ė	-	
L	1	_	противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
ŀ	9		Задачи перечислены в полном объеме.
2	2	-	задати перетиолены в полном объеме.
ħ	5		
ľ	١	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
Ļ	+		
Ш	1	_	Задачи перечислены неверно.
(	)		оиди ит пере и елены певерно.
r	t		Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в
ŀ	3	/	лечении денного заболевания.
ŀ	╁		
			В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный
			массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цуботерапия,
			микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических
r	1		активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.;
ľ	1		аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание
			аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую и
L			по Ямомото) и др.
I	þ		M DT
	2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
Ī	4		
١		-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
Ļ	1		
μ	1		Методы РТ перечислены неправильно
(	)		тегоды I I пере menerus пепривилию
ſ	T		
ŀ	t		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина
ļ	]		введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале,
μ	٦.		количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости
			от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время
			назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
T	T		Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней,
r	$\exists$	_	
			направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы
L			выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.

<b>4</b>	8		
IJ	0 2.	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.	
	C /	Изоманами пофициализми на мусти с 225 очетом — « () 22	
đ	/ 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
E	<u>-</u>	006	
Р 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.	
P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.	
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.	
$(\cdot)$		Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 55, 29, 37, 41, 13, 63, 121.	
– В	<b>``</b>	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии.	
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.	
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме	
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.	
(1)	-	Используют точки каналов: мочевого пузыря (V-8, 10, 11, 41); заднесрединного (Т-14, 16, 17, 20); желчного пузыря (VB-19, 20, 21, 39); толстой кишки (GI-4, 11); тонкой кишки (IG-3, 4, 11); «трех обогревателей» (TR-5, 8); перикарда (МС-7); легких (Р-7	
В	-	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.	
0	-	Способы воздействия указаны неверно.	
P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.	
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.	
		предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.	
		При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления	

3	v -	Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по смешанному типу, средней степени тяжести, с нарушением ритма по типу желудочковой экстрасистолии, НК 0. Жалобы на периодически возникающую после стрессовых ситуаций головную боль, периодически подъемы АД до 130/80-140/80, боли в сердце в покое, чувство «замирания в сердце», раздражительность, нарушение сна	
I	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.	
(.)	<del>)</del> -	Задачи РТ: оказать гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие	
F 2	-	Задачи перечислены в полном объеме.	
H 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
E	)   	Задачи перечислены неверно.	
F	2 Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые лечении данного заболевания.		
(*)	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечнь массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапи микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологически активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и драгурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревани аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую по Ямомото) и др.		
Р - Методы РТ перечислены правильно в должном объеме		Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
Р - Методы РТ перечислены в неполном объеме		Методы РТ перечислены в неполном объеме	
E	Р - Методы РТ перечислены неправильно		
F	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глуби введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в кана количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное врема вазначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.		
E)	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.	
2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.	

P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.	
P 0	- Способы воздействия указаны неверно.		
B - 3	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—поджелудочной железы (RP-6), сердца (С-7), перикарда (МС-6,7), мочевого пузыря заднесрединном (Т-14,20,24), внемеридианные (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62).	
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.	
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме	
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.	
B 3	J	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19, 34, 51, 55, 59, 72 <sup>1</sup> ,	
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.	
P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.	
P 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.	
	_	007	
4	C /	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
1	C / 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.	
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	
У	-	Пациент 50 лет. Д-3: Гипертоническая болезнь І. АГ.1. Риск 2. Жалобы на головную боль, раздражительность, нарушение сна. Постоянные подъемы АД в течении года до 150/90. На ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек органических изменений нет	
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.	

_			
$\mathcal{G}$	3 - Задачи РТ: гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическ спазмолитическое, седативное действие.		
P 2	1	- Задачи перечислены в полном объеме.	
P 1	1	- Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P 0	1	Задачи перечислены неверно.	
В	2	2 Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.	
(1)	ı	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).	
P 2	1	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P 1	1	Методы РТ перечислены в неполном объеме	
P 0	Р 0 - Методы РТ перечислены неправильно		
В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глуби введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в кана количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимос от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное вреназначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.		
(1)	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При нормализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.  На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.		
P 2	1	Способы воздействия указаны верно и подробно.	
P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.	
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.	
L			
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.	
		Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—	
G	-	поджелудочной железы (RP-6), сердца (С-7), перикарда (МС-6,7), мочевого пузыря	

	заднесрединном (Т-14,20,24), внемеридианные (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62)			
P 2	- 1	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.		
P 1	Р - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме			
P 0	1	Каналы и их точки перечислены неверно.		
В	_	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии		
G	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках $13, 19, 34, 51, 55, 59, 72^1,$		
P 2	1	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.		
P 1	1	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.		
P 0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.		
F	-	008		
Φ	C / 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии		
Ф	C / 0 2. 8	С / / О Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями. 2. 8		
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА		
У		ВОПРОСЫ Пациент 52 лет. Д-з: ИБС: стабильная стенокардия напряжения. ФК І, НК 0. Жалобы на боли в сердце при физической нагрузке, головная боль, раздражительность, плохой сон.		
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.		
G	-	Задачи РТ: анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, липолитическое действие.		
Р - Задачи перечислены в полном объеме.		Задачи перечислены в полном объеме.		
р - Задачи перечислены не в полном объеме (частично).		Задачи перечислены не в полном объеме (частично).		
P 0	- Задачи перечислены неверно.			
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.		

5 -	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейно сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джо гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапи микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).		
р		Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P 1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме	
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно	
Введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в за от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное количество процедур в курсе и курсе		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.	
Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже ср на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощуг направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, пере на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренну меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла напри перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Ми		направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ,	
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.	
P 1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.	
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.	
B 4		Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.	
5 -	-	Используют точки каналов: сердца (C-1, 5, 6, 7); перикарда (MC-2, 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кишки (GI-4, 11); желудка (E-36); переднесрединного (J-14, 17); мочевого пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианные (TBM-59, 132); «новая» точка (HT-28).	
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.	
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме	
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.	
B 5	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии	

P 2	- Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.		
P 1	-	- Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.	
P 0	-	- Аурикулярные точки перечислены с ошибками.	
ļ		000	
Ľ	-	009	
d	/ 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
4	С / 10 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями. 2. 8		
L			
V	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	
7	-		
E	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.	
(-)	-	Задачи РТ:.	
P 2	1	Задачи перечислены в полном объеме.	
P 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P 0	- Задачи перечислены неверно.		
E	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.	
(1)	1	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).	
Р - Методы РТ перечислены правильно в должном объеме		Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P 1	Р 1 - Методы РТ перечислены в неполном объеме		
P 0	-	Методы РТ перечислены неправильно	
L			
E	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.	

Р - Каналы 0 - Перечис		Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме  Каналы и их точки перечислены неверно.  Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии  В общести измертиция от разграми и предументация и пользуемы в дерении и данной патологии.
Ī	- -	В области ушной раковины стимулируют следующие точки из перечисленных: 13, 19, Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
2	2 -	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
Ī	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
(	) _	Аурикулярные точки перечислены с ошиоками.
Ļ		010
	-	010
	C	
(	/ I 0 1. 8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
(	C / I 0 2. 8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.

И	- ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ		
степени тяжести (стадия II), фаза стихающего обострения. ДН I.		Жалобы на кашель с умеренным количеством светлой мокроты, затруднение выдоха,	
	1	TI (DT)	
EI CO	1 Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуаци Задачи РТ: оказать бронхолитическое, муколитическое, противовоспалительное анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое седативное, действие.		
P 2	ı	Задачи перечислены в полном объеме.	
P 1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P 0	-	Задачи перечислены неверно.	
В	В 2 Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используем лечении данного заболевания.		
Э- Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечны сегментарный массаж, цубо-терапия, микроигл гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аури		Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).	
P 2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
Р - Методы РТ перечислены в неполном объеме Р - Методы РТ перечислены неправильно		Методы РТ перечислены в неполном объеме	
		Методы РТ перечислены неправильно	
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время	
	-	назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год. Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании обструктивного синдрома, кашля нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.	

СТ		
P 2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
Р - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.		Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P 0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
(')	_	Используют точки каналов: легких (P-1, 2, 5, 7, 9); толстой кишки (GI-4, 20); желудка (E-13, 15, 36); селезенки—поджелудочной железы (RP-6), мочевого пузыря (V-11, 12, 13, 42, 43); почек (R-2,3,6,27); «трех обогревателей» (TR-5), желчного пузыря (VB-20), печени (F-14), переднесрединном (J-6, 17, 21, 22, 23); внемеридианные (TBM-30, 32, 33); «новые» точки (HT-45, 50).
P 2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P 1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P 0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В:	<b>٦</b> I	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках: 13, 15, 29, 31, 51, 55, 60,
P 2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P 1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P		
0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.

#### 5. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

- 5.1. Перечень кейс- заданий к зачету, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности: вопросы по разделам практики.
- 5.1.1. Кейс- задания зачету по практике «Производственная (клиническая) практика 3» для оценки компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12

Вид	Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н	001
Ф	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

	8
Φ	С / 0 Назначение рефлексотерапии пациентам с 2 заболеваниями и (или) состояниями
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. Жа-лобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие после еды.
В	Перечислите основные задачи рефлексоте- 1 рапии (РТ) в данной клинической ситуа- ции.
Э	Задачи рефлексотерапии: купирование боли, воспаления, улучшение трофики.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
В	Перечислите основные методы (не менее 5-2ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
Э	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
P2	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно

	T I
В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа.  Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при купировании болевого синдрома, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, зона небольшой гиперемии вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Мини-
P2	мум 2 курса РТ в год (весной и осенью).  Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
В	Перечислите основные каналы (не менее 4) 4и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (E-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (TR-6), желчного пузыря (VB-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).
P2	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	- Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.

	П
В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.
Э	Одновременно с корпоральной иглотера- пией проводят стимуляцию точек ушной ра- ковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желу- док), 88 (двенадцатиперстная кишка).
P2	- Аурикулярные точки перечислены пра- вильно в полном объеме.
P1	- Аурикулярные точки перечислены пра- вильно, но в неполном объеме.
Р0	- Аурикулярные точки перечислены с ошиб- ками.
Н	- 002
Φ	Проведение обследования пациентов с забо- певаниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Φ	С / 0 Назначение рефлексотерапии пациентам с 2 заболеваниями и (или) состояниями . 8
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, легкой степени тяжести. Жалобы: слабость, раздражительность, головные боли, снижение внимания, нарушение сна.
	Пополицанита соморум за получени дей получени
В	Перечислите основные задачи рефлексоте- 1 рапии (РТ) в данной клинической ситуа- ции.
Э	Задачи рефлексотерапии: оказать гипотен- зивное, иммуномодулирующее, нейротро- фическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.

P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
В	Перечислите основные методы (не менее 5- 2ти) рефлексотерапии, используемые в лече- нии денного заболевания.
Э	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
P2	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при нормализации АД, сна, улучшения настроения, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.

	На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).
P2	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
В	Перечислите основные каналы (не менее 4) 4и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—поджелудочной железы (RP-6), сердца (С-7), перикарда (МС-6,7), мочевого пузыря (V-15,25), желчного пузыря (VB-20,21), печени (F-13), переднесрединного (J-14,17), заднесрединного (T-14,20,24).
P2	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.
В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
Э	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 13 (надпочечник), 19 (гипертония), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэеь), 59 (снижвющая артериальное даление), 72¹(завиток 1), 78 (верхушка уха), 105 (снижающая артериальное давление, вторая)
P2	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
Р0	Аурикулярные точки перечислены с ошиб-ками.
Н	- 003
Ф	Проведение обследования пациентов с забо- певаниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

Φ	С / 0 Назначение рефлексотерапии пациентам с 2 заболеваниями и (или) состояниями 8
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	Пациент 46 лет. Д-3: Ожирение III степени алиментарно-конституциональное, андроидный тип с развернутой симптоматикой метаболического синдрома. Жалобы: избыточный вес, одышка при физической нагрузке, быстрая утомляемость, раздражительность.
В	Перечислите основные задачи рефлексоте- 1 рапии (РТ) в данной клинической ситуа- ции.
Э	Задачи рефлексотерапии: липолитическое, - иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
1 0	Зада и пере ислены певерно.
В	Перечислите основные методы (не менее 5-2 ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
Э	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотера-пия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
P2	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
	· · · · · ·

В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
В	Перечислите основные каналы (не менее 4) 4и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	Используют точки каналов: переднесрединного (J-4), печени (F-13), мочевого пузыря (V-20, 23, 43); легких (P-7), селезенки-поджелудочной железы (RP-1, 2, 3, 4, 6); почек (R-3, 6); «трех обогревателей» (TR-4, 5), желудка (E-33, 36, 45), перикарда (МС6),
P2	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.
В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
Э	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 17 (жажда), 18 (голода), 22 (железы внутренней секреции), 26а (придаток мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэнь), 95

	(почка), .96 (поджелудочная жедеза), 97 (печень), 122 (панкреатит).
P2	Аурикулярные точки перечислены пра-
1 2	вильно в полном объеме.
P1	_ Аурикулярные точки перечислены пра-
	вильно, но в неполном объеме.
P0	_ Аурикулярные точки перечислены с ошиб-
	ками.
TI TI	1004
Н	- 004
Φ	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Φ	С / ОНазначение рефлексотерапии пациентам с 2заболеваниями и (или) состояниями 8
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	Пациент 65 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя люмбалгия, мышечно-тонические проявления, выраженный болевой синдром. Жалобы: боли в пояснице слева, усиливающиеся при движении, ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, слабость, раздражительность, плохой сон.
В	Перечислите основные задачи рефлексоте- 1 рапии (РТ) в данной клинической ситуа- ции.
Э	Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
	Перечислите основные методы (не менее 5-
В	2ти) рефлексотерапии, используемые в лече-
	нии денного заболевания.

	<del> </del>
Э	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия и др  Методы РТ перечислены правильно в
P2	должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	При выраженной боли — І вариант тормозного метода: иглы вводят медленно, глубоко, до появления выраженных предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, выраженная зона гиперемии вокруг иглы, используют 2-3 БАТ, время постановки игл 40 — 60 минут и более. При некотором стихании боли используют ІІ вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.

	На курс от 10 процедур. Повторный курс
	можно назначать через 1-2 месяца. Мини-
	мум 4 курса РТ в год.
D2	Способы воздействия указаны верно и по-
P2	дробно.
	Способы воздействия указаны верно, но не
P1	полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
	Спосооы возденетым указаны певерно.
	Перечислите основные каналы (не менее 4)
В	<del> </del>
В	4и их основные точки, используемы в лече-
	нии данной патологии.
Э	Используют точки каналов: мочевого пузыря (V-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 67); желчного пузыря (VB-30, 34, 39); желудка (Е-36, 41, 44); заднесрединного (Т-2, 4); тонкой кишки (IG-3), толстой кишки (GI-4). Для выполнения правила «верх—низ», а по другим теориям, чтобы «блокировать» каналы, используют точки V-11, 41, 60; T-14.
	Каналы и их точки перечислены верно в
P2	полном объеме.
P1	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
DO.	
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.
_	Перечислите основные аурикулярные точки
В	5 (не менее 4), используемы в лечении данной
	патологии.
Э	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 40 (поясничный отдел позвлночника), 38 (крестцовый отдел позвоночника), 54 (люмбалгия), 53 (ягодица), 29 (затылок). На ухе можно оставлять микроиглы на 2—3 дня.
P2	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
Р0	Аурикулярные точки перечислены с ошиб-ками.
Н	- 005
	d
Φ	Проведение обследования пациентов с за- болеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

	8
Φ	С / 0 Назначение рефлексотерапии пациентам с 2 заболеваниями и (или) состояниями.
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	Пациент 47 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя цервикобрахиалгия, мышечнотонические проявления, умеренно выраженный болевой синдром Жалобы на боль в шейном отделе позвоночника слева с иррадиацией в левую руку. Ограничение движений в шейном отделе позвоночника. Раздражительность, бессонница.
В	Перечислите основные задачи рефлексоте- 1 рапии (РТ) в данной клинической ситуа- ции.
Э	Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
В	Перечислите основные методы (не менее 5-2ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
Э	В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цуботерапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую и по Ямомото) и др.

P2	Методы РТ перечислены правильно в
12	должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объ-
	еме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
	Укажите подробно способы воздействия
	(раздражения) иглой: скорость, глубина вве-
	дения игл, постановку игл в зависимости от
	протекания энергии в канале, количество
В	[3](БАТ) точек, используемое в процедуре,
В	время воздействия в зависимости от спо-
	соба, Укажите минимальное количество
	процедур в курсе, минимальное время
	назначения повторного курса, минимальное
	количество курсов РТ за год.
	Используют II вариант тормозного метода.
	Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на
	предусмотренную глубину, до появления
	предусмотренных ощущений, направление
	иглы против хода энергии в канале, зона ги-
	перемии вокруг иглы выражена, используют
	4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.
	При купировании болевого синдрома пере-
	ходят на гармонизирующий метод: вводят
Э	со средней скоростью, на предусмотренную
	или меньшую глубину, до появления преду-
	смотренных ощущений, игла направлена
	перпендикулярно ходу энергии канала, не-
	большая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ,
	время постановки игл 25 мин.
	На курс от 10 процедур. Повторный курс
	можно назначать через 1-2 месяца. Мини-
	мум 4 курса РТ в год.
P2	Способы воздействия указаны верно и по-
Γ2	дробно.
P1	Способы воздействия указаны верно, но не
ГІ	полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
	Перечислите основные каналы (не менее 4)
В	4 и их основные точки, используемы в лече-
	нии данной патологии.
	Используют точки каналов: мочевого пу-
	зыря (V-8, 10, 11, 41); заднесрединного (Т-
	14, 16, 17, 20); желчного пузыря (VB-19, 20,
Э	21, 39); <u>толстой кишки</u> (GI-4, 11); <u>тонкой</u>
	кишки (IG-3, 4, 11); «трех обогревателей»
	(TR-5, 8); <u>перикарда</u> (MC-7); <u>легких</u> (P-7
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DO.	Каналы и их точки перечислены верно в
P2	полном объеме.
P1	Каналы и их точки перечислены верно, в
	неполном объеме
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.
	l n
В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 3), используемы в лечении данной
В	патологии.
	Одновременно с корпоральной иглотера-
Э	-пией проводят стимуляцию точек ушной ра-
	ковины: 55, 29, 37, 41, 13, 63, 121.
P2	Аурикулярные точки перечислены пра-
1 2	вильно в полном объеме.
P1	- Аурикулярные точки перечислены пра-
	вильно, но в неполном объеме.
PO	- Аурикулярные точки перечислены с ошиб-ками.
	IMMINIT.
Н	- 006
	d
	/
Φ	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью
*	назначения рефлексотерапии
	o
<b>A</b>	0Назначение рефлексотерапии пациентам с
Φ	2 заболеваниями и (или) состояниями.
	8
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА
	ВОПРОСЫ
	Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая
	дистония по смешанному типу, средней сте-
	пени тяжести, с нарушением ритма по типу
У	желудочковой экстрасистолии, НК 0.
	- Жалобы на периодически возникающую по-
	сле стрессовых ситуаций головную боль, периодически подъемы АД до 130/80-140/80,
	боли в сердце в покое, чувство «замирания в
	сердце», раздражительность, нарушение сна
В	перечислите основные задачи рефлексоте-
. D	рапии (РТ) в данной клинической ситуации.

Ι	Задачи РТ: оказать гипотензивное, иммуно-
	,
Э	- модулирующее, нейротрофическое, спазмо-
	литическое, седативное действие
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
D1	Задачи перечислены не в полном объеме
P1	(частично).
P0	Задачи перечислены неверно.
10	оиди из пере измены певерие.
	П
,	Перечислите основные методы (не менее 5-
B 2	2 ти) рефлексотерапии, используемые в лече-
	нии данного заболевания.
	В лечении используют: корпоральную ре-
	флексотерапию - иглотерапия, точечный
	массаж, точечно-линейный сегментарный
	массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексо-
	терапия, су-джок, гирудотерапия, прогрева-
Э	ние биологических активных точек (БАТ)
	электро-рефлексотерапия, лазерорефлексо-
	терапия и др.; аурикулярную РТ - иглотера-
	пия, микроиглотерапия, точечный массаж,
	прогревание аурикулярных точек (АТ),
	электрорефлексотерапия, скальптерапию
	(классическую и по Ямомото) и др.
	Методы РТ перечислены правильно в
P2	должном объеме
P1	- Методы РТ перечислены в неполном объ-
7.0	еме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
	Укажите подробно способы воздействия
	(раздражения) иглой: скорость, глубина вве-
	дения игл, постановку игл в зависимости от
	протекания энергии в канале, количество
	(БАТ) точек, используемое в процедуре,
B	время воздействия в зависимости от спо-
	соба, Укажите минимальное количество
	процедур в курсе, минимальное время
	назначения повторного курса, минимальное
	количество курсов РТ за год.
	Используют II вариант тормозного метода.
	Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на
	предусмотренную глубину, до появления
	предусмотренных ощущений, направление
_	иглы против хода энергии в канале, зона ги-
Э	перемии вокруг иглы выражена, используют
	4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.
	При купировании болевого синдрома, нор-
	мализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вво-
<u> </u>	

P2	дят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	- Способы воздействия указаны неверно.
В	Перечислите основные каналы (не менее 4) 4и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—поджелудочной железы (RP-6), сердца (Счени (F-13), переднесрединном (J-14,17), заднесрединном (T-14,20,24), внемеридианные (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62).
P2	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
PO	- Каналы и их точки перечислены неверно.
В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19, 34, 51, 55, 59, 72 <sup>1</sup> ,
P2	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	Аурикулярные точки перечислены с ошиб-ками.
Н	-007
Φ	Проведение обследования пациентов с за- болеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии

	8
Φ	С / 0 Назначение рефлексотерапии пациентам с 2 заболеваниями и (или) состояниями.
И	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И - ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	Пациент 50 лет. Д-3: Гипертоническая болезнь І. АГ.1. Риск 2. Жалобы на головную боль, раздражительность, нарушение сна. Постоянные подъемы АД в течении года до 150/90. На ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек органических изменений нет
	Перечислите основные задачи рефлексоте-
В	рапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	Задачи РТ: гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	- Задачи перечислены в полном объеме.
P1	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	- Задачи перечислены неверно.
В	Перечислите основные методы (не менее 5-2ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).
P2	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	- Методы РТ перечислены неправильно
В	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество

Э	(БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.  Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При нормализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.  На курс от 10 процедур. Повторный курс	
P2	можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Способы воздействия указаны верно и по-	
	дробно. Способы воздействия указаны верно, но не	
P1	полностью.	
P0	- Способы воздействия указаны неверно.	
В	Перечислите основные каналы (не менее 4) 4и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.	
Э	Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—поджелудочной железы (RP-6), сердца (Счени (F-13), переднесрединном (J-14,17), заднесрединном (T-14,20,24), внемеридианные (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62).	
P2	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.	
P1	- Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме	
P0	- Каналы и их точки перечислены неверно.	

В	Перечислите основные аурикулярные точки 5 (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19, 34, 51, 55, 59, 72 <sup>1</sup> ,
P2	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	Аурикулярные точки перечислены с ошиб-ками.

Н	-	008	
Φ	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)	
Ψ	C/01.8	состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
Φ	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)	
Ψ	C/02.0	состояниями.	
		- J	
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	
		Пациент 52 лет. Д-з: ИБС: стабильная стенокардия напряжения.	
У	_	ФК I, НК 0.	
		Жалобы на боли в сердце при физической нагрузке, головная боль,	
		раздражительность, плохой сон.	
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной	
		клинической ситуации.	
_		Задачи РТ: анальгетическое, иммуномодулирующее,	
Э	-	нейротрофическое, спазмолитическое, седативное,	
P2		липолитическое действие.	
P2 P1	-	Задачи перечислены в полном объеме.	
P0	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
PU	-	Задачи перечислены неверно.	
		Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,	
В	2	используемые в лечении данного заболевания.	
		Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж,	
		точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия,	
Э	_	микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание	
		БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия,	
		точечный массаж, прогревание АТ).	
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме	
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно	
		· ·	
		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:	
D	2	скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от	
В	3	протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек,	
		используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от	

минимальное время назначения повторного курса, минималы количество курсов РТ за год.  Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, появления предусмотренных ощущений, направление иглы прот хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании болевого синдрома, нормализациям исперемия вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании болевого синдрома, нормализациям исперемия конформация и пераусмотренную или меньши глубину, до появления предусмотренную или меньши глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольши гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианы (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.			
Количество курсов РТ за год.			способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе
Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, появления предусмотренных ощущений, направление иглы прот хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании болевого синдрома, нормализат эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р3 - Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			минимальное время назначения повторного курса, минимальное
скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, появления предусмотренных ощущений, направление иглы прот хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании болевого синдрома, нормализат эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольы гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяпа. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианы (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены неверно.  Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
появления предусмотренных ощущений, направление иглы прог хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании болевого синдрома, нормализат эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианы (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р2 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выраже используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализаг эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольы гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно. Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью. Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии. Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме. Р2 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализат эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меныш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно. Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью. Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридиання (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			появления предусмотренных ощущений, направление иглы против
При купировании болевого синдрома, нормализат эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий мет вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольш гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно. Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью. Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианы (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена
			используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.
вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридиання (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			При купировании болевого синдрома, нормализации
вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньш глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В Каналы и их точки перечислены неверно.  В Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии	Э	_	
глубину, до появления предусмотренных ощущений, и направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольп гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно. Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью. Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридиань (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме. Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В Б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольш гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианы (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В Каналы и их точки перечислены неверно.			
гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р2 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии			
2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.			
Р2       -       Способы воздействия указаны верно и подробно.         Р1       -       Способы воздействия указаны верно, но не полностью.         Р0       -       Способы воздействия указаны неверно.         В       4       Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.         В       Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).         Р2       -       Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.         Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -			
Р1       -       Способы воздействия указаны верно, но не полностью.         Р0       -       Способы воздействия указаны неверно.         В       4       Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.         В       Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).         Р2       -       Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.         Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -	D2		
РО       -       Способы воздействия указаны неверно.         В       4       Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.         Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кип пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).         Р2       -       Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.         Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -			
В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точ используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии		-	
В 4 используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии  3 -	P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В 4 используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии  3 -			
Используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой киш пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианн (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии  3 -	В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки
	В		используемы в лечении данной патологии.
			Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС-2,
(ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В б Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии Э -			6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой кишки
Р2       -       Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.         Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -	Э	-	пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианные
Р2       -       Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.         Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -			(ТВМ-59, 132); «новая» точка (HT-28).
Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии Э -			
Р1       -       Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме         Р0       -       Каналы и их точки перечислены неверно.         В       5       Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии         Э       -	P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
РО - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии  Э -	P1	_	
В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее используемы в лечении данной патологии Э -		_	
В опользуемы в лечении данной патологии  Э -	10		Transmit in the transmit model in edeption
В обществой используемы в лечении данной патологии  Э -			Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3).
9 -	В	5	
	_		используемы в лечении данной патологии
Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме		-	
	P2	-	<u> </u>
	P1	_	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном
ооъеме.			
РО - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.	P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н - 009	Н	_	009
— Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)	<b>.</b>	C/01 0	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)
Ф С/01.8 С/01.8 состояниями с целью назначения рефлексотерапии	Ψ	C/01.8	
Назнанение вефпексотерании паниентам с заболеваниями и (или	_	G/0.0	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)
Ф С/02.8 С/02.8 состояниями.	Φ	C/02.8	
	$\dashv$		
ознакомьтесь с ситуацией и дайте	$\dashv$		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАНИЕЙ И ЛАЙТЕ
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	И	-	
N/	V		LASDELITY I DIE O I DE I DI HA DOIH OCDI
у -	У		

		- 1 (PE)	
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной	
клинической ситуации.			
Э	-	Задачи РТ:.	
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.	
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P0	_	Задачи перечислены неверно.	
		Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,	
В	2	используемые в лечении данного заболевания.	
		,	
		Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия,	
Э		микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание	
	-		
		БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия,	
D2		точечный массаж, прогревание АТ).	
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме	
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно	
		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:	
		скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от	
		протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек,	
В	3	используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от	
		способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе,	
		минимальное время назначения повторного курса, минимальное	
		количество курсов РТ за год.	
		Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со	
		скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до	
		появления предусмотренных ощущений, направление иглы против	
		хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена,	
		используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.	
		При купировании болевого синдрома, нормализации	
Э	_	эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод:	
		вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую	
		глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла	
		направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая	
		гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.	
		На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-	
		2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.	
P2	_	Способы воздействия указаны верно и подробно.	
P1	_	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.	
PO	_	Способы воздействия указаны неверно.	
10	-	спосооы возденствил указаны певерпо.	
		Пополука пута о оморум во момо му (мо момо А) и им о оморум во от	
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,	
		используемы в лечении данной патологии.	
Э	-		
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.	
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме	
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.	

В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3),	
		используемы в лечении данной патологии	
Э	-	В области ушной раковины стимулируют следующие точки и	
P2		перечисленных: 13, 19, 34, 51, 59, 72', 78, 100, 104.	
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.	
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном	
P0		объеме.	
го		Аурикулярные точки перечислены с ошибками.	
Н		010	
		Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)	
Ф	C/01.8	состояниями с целью назначения рефлексотерапии	
Φ	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)	
Ψ	C/02.0	состояниями.	
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ	
		Задача. Пациент 56 лет. Д-з: Хроническая обструктивная болезнь	
		легких, средней степени тяжести (стадия ІІ), фаза стихающего	
У		обострения. ДН I.	
y	-	Жалобы на кашель с умеренным количеством светлой мокроты,	
		затруднение выдоха, одышку при повышенной физической	
		нагрузке.	
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной	
		клинической ситуации.	
		Задачи РТ: оказать бронхолитическое, муколитическое,	
Э	-	противовоспалительное, анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, действие.	
		неиротрофическое, спазмолитическое, седативное, деиствис.	
P2	_	Задачи перечислены в полном объеме.	
P1	_	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).	
P0		Задачи перечислены неверно.	
- D	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,	
В	2	используемые в лечении данного заболевания.	
		Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж,	
		точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия,	
Э	-	микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание	
		БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия,	
		точечный массаж, прогревание АТ).	
P2		Методы РТ перечислены правильно в должном объеме	
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме	
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно	
		Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:	
D	3	скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от	
В	3	протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от	
		способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе,	
		репособа, экажите минимальное количество процедур в курсе,	

P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
Э	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках: 13, 15,
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
10		remain a na to tan nepe menenni nebepito.
P0		Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Каналы и их точки перечислены неверно.
P2 P1		Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P2	_	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
Э	-	Используют точки каналов: легких (P-1, 2, 5, 7, 9); толстой кишки железы (RP-6), мочевого пузыря (V-11, 12, 13, 42, 43); почек (R-2,3,6,27); «трех обогревателей» (TR-5), желчного пузыря (VB-20), печени (F-14), переднесрединном (J-6, 17, 21, 22, 23); внемеридианные (TBM-30, 32, 33); «новые» точки (HT-45, 50).
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
Э Р2	-	эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  Способы воздействия указаны верно и подробно.
		количество курсов РТ за год.  Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  При купировании обструктивного синдрома, кашля нормализации
		минимальное время назначения повторного курса, минимальное

# **6. Критерии оценивания результатов обучения** Для зачета

Dooyen Total a of ymornia	Критерии оценивания	
Результаты обучения	Не зачтено	Зачтено
		Уровень знаний в объеме,
	Уровень знаний ниже	соответствующем программе
Полнота знаний	минимальных требований.	подготовки. Могут быть
	Имели место грубые ошибки.	допущены несущественные
		ошибки

Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи, выполнены все задания. Могут быть допущены несущественные ошибки.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач. Могут быть допущены несущественные ошибки.
Мотивация (личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Проявляется учебная активность и мотивация, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи.
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Средний/высокий

#### Для тестирования:

Оценка «5» (Отлично) - баллов (100-90%)

Оценка «4» (Хорошо) - балла (89-80%)

Оценка «З» (Удовлетворительно) - балла (79-70%)

Менее 70% – Неудовлетворительно – Оценка «2»

#### Разработчик:

- 1. Белова Анна Наумовна д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской реабилитации
- 2. Беспалова Анна Владимировна к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации.
- 3. Исраелян Юлия Александровна к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации
- 4. Карпова Жанна Юрьевна -к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации