

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПСИХИАТРИЯ

Специальность: 31.08.42 Неврология

Кафедра: психиатрии

Форма обучения: очная

Нижний Новгород
2023

1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Психиатрия» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины «Психиатрия». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. Перечень оценочных средств

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине «Психиатрия» используются следующие оценочные средства:

| № п/п | Оценочное средство | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
|-------|---------------------|---|---|
| 1 | Тест | Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Ситуационные задачи | Способ контроля, позволяющий оценить критичность мышления и степень усвоения материала, способность применить теоретические знания на практике. | Перечень задач |

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и видов оценочных средств

| Код и формулировка компетенции | Этап формирования компетенции | Контролируемые разделы дисциплины | Оценочные средства |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7 | Текущий | Раздел 1. Организация психиатрической помощи. Раздел 2. Общая психопатология. Раздел 3. Частная психиатрия и наркология. | Тестовые задания Ситуационные задачи |
| ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-7 | Промежуточный | Раздел 1. Организация психиатрической помощи. Раздел 2. Общая психопатология. Раздел 3. Частная психиатрия и наркология. | Тестовые задания |

4. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тест, ситуационная задача.

4.1. Тестовые задания для оценки компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6

1. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА ИМЕЮТ ПРАВО ЗАПРАШИВАТЬ

- а) никому не дано такого права
- б) соседи
- в) его сотрудники по работе

- г) судебно-следственные органы и вышестоящие органы здравоохранения
д) участковые врачи территориальных поликлиник

2. СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ДАЕТСЯ

- а) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в письменной форме
- б) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в устной форме
- в) его законным представителем в письменной форме
- г) его законным представителем в устной форме
- д) другими ближайшими родственниками

3. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ИМЕЮТ

- а) все лица без исключения
- б) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением
- в) только госпитализированные в недобровольном порядке
- г) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера
- д) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера, а также тех, кто госпитализируется в недобровольном порядке

4. ПРИ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО, В НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ, РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ БОЛЬНОГО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ

- а) врачом-психиатром единолично
- б) только комиссией врачей-психиатров
- в) только с санкции прокурора
- г) только по постановлению суда
- д) только по разрешению главного психиатра

5. СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ ОТ БОЛЬНОГО ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

- а) только в начале курса терапии
- б) при каждом и любом изменении первоначальной схемы терапии
- в) в начале курса терапии, а также при смене метода терапии и таких изменениях в лечении, которые связаны с существенным возрастанием риска побочных эффектов и осложнений
- г) при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар при проведении принудительного лечения

6. НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БОЛЬНОГО, СОСТОЯЩЕГО ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- а) только с разрешения главного врача диспансера
- б) только с разрешения главного психиатра данной территории
- в) только с санкции судьи
- г) только с санкции прокурора
- д) по единоличному решению врача-психиатра, без получения чьего-либо разрешения

7. ВЫПИСКА ПАЦИЕНТА, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПРОИЗВОДИТСЯ

- а) по его личному заявлению
- б) по единоличному решению лечащего врача

- в) по заключению комиссии врачей-психиатров либо по постановлению судьи об отказе в продлении недобровольной госпитализации
- г) по просьбе родственников
- д) по решению главного врача психиатрического стационара

8. ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД ПО ВОПРОСУ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЦА В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДАЕТСЯ

- а) родственниками лица
- б) участковым психиатром
- в) представителем психиатрического учреждения, в котором находится лицо
- г) комиссией врачей-психиатров
- д) ни одно из перечисленных

9. РЕШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО

- а) врачом любой специальности
- б) фельдшером станции скорой медицинской помощи
- в) только врачом-психиатром
- г) органом управления здравоохранением
- д) ни одним из перечисленных

10. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ЯВЛЯЕТСЯ

- а) его просьба или согласие
- б) согласие обоих родителей и решение органа опеки и попечительства
- в) просьба или согласие его законного представителя, а при отсутствии такового решение органа опеки и попечительства
- г) просьба или согласие его дальнего родственника

11. АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) физической истощаемости
- б) психической истощаемости
- в) фиксационной амнезии
- г) аффективной лабильности
- д) вегетативными расстройствами

12. КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИВНАЯ ТРИАДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а) эмоциональным торможением
- б) двигательным торможением
- в) идеаторным торможением
- г) всем перечисленным
- д) ничем из перечисленного

13. К СОМАТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕПРЕССИИ ОТНОСЯТСЯ

- а) запоры
- б) дисменорея
- в) похудание
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

14. ЧТО ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В КЛИНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНЫХ С «МАСКИРОВАННЫМИ ДЕПРЕССИЯМИ»

- а) нарушения мимики и пантомимики
- б) пониженное настроение
- в) интеллектуально-мнестические нарушения
- г) изменения личности
- д) соматовегетативные функциональные расстройства

15. МАНИАКАЛЬНАЯ ТРИАДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а) повышенным настроением
- б) ускорением ассоциаций
- в) двигательным возбуждением
- г) всем перечисленным
- д) ничем из перечисленного

16. ОБСЕССИВНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а) возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений, двигательных актов и т.д. помимо желания
- б) сознанием их болезненности, критическим отношением к ним
- в) бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих страданий
- г) всем перечисленным
- д) ничем из перечисленного

17. НАВЯЗЧИВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) появления вопреки разуму, воли и чувству
- б) стремления совершать какое-либо бессмысленное, часто опасное действие
- в) острого овладения рассудком, подчиняя себе все поведение больного
- г) возникновения при этом страха, связанного также с непонятностью появления чуждого влечения
- д) чувством навязанности, сделанности из вне

18. НАВЯЗЧИВЫЙ СТРАХ (ФОБИЯ) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) неопределенного чувства страха, без понимания его бессмысленности
- б) понимания его бессмысленности, попытками справиться с ним
- в) наличия конкретного содержания
- г) интенсивного и непреодолимого страха, охватывающего больного
- д) возможности быть всеохватывающим

19. ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПСИХОПАТИИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ

- а) на легкие - с хорошими компенсаторными механизмами
- б) на выраженные - с частой декомпенсацией
- в) на глубокие - вариант патологического развития при психопатии
- г) на все перечисленные
- д) все перечисленное неверно

20. К ПРИЗНАКАМ РЕАКТИВНЫХ ПСИХОЗОВ ОТНОСЯТСЯ

- а) содержание психоза отражает психическую травму
- б) без психотравмы психоза бы не было
- в) с исчезновением причин проходит психоз

- г) все перечисленные
- д) верно а) и в)

21. АФФЕКТИВНО-ШОКОВЫЕ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) наиболее острыми формами реактивных психозов, сопровождающимися резкими эндокринными и вазомоторными сдвигами
- б) состояниями, возникающими в связи с внезапными чрезмерными по силе потрясениями
- в) состояниями, протекающими в гипер- и гипокинетической формах
- г) верно б) и в)
- д) всем перечисленным

22. РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) патологической реакцией на психические травмы или неблагоприятные ситуации
- б) патологической реакцией психотического уровня
- в) развитие их зависит от конституциональных особенностей личности, перенесенных заболеваний, физического состояния и возраста
- г) все перечисленное верно
- д) все перечисленное неверно

23. ДЛЯ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ

- а) неврозоподобных расстройств
- б) бредовых расстройств
- в) галлюцинаторно-бредовых расстройств
- г) судорожного синдрома
- д) верно а) и г)

24. СПЕЦИФИЧЕСКИМИ, ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ ТОЛЬКО ПРИ ШИЗОФРЕНИИ, ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАССТРОЙСТВА

- а) синдром Кандинского - Клерамбо
- б) псевдогаллюцинации
- в) интерпретативный бред
- г) все перечисленные
- д) ничего из перечисленного

25. ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ (НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ) ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

- а) снижения энергетического потенциала
- б) эмоционального обеднения
- в) нарастающей интравертированности
- г) утраты единства психических процессов
- д) тугоподвижности, замедленности всех психических процессов

26. ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ

- а) на юношеский возраст
- б) на детский возраст
- в) на зрелый возраст
- г) на период инволюции
- д) на поздний возраст

27. ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ СВОЙСТВЕННЫ

- а) неадекватная мимика
- б) исчезновение вазомоторных реакций
- в) "стальной" блеск глаз
- г) замедленность или ускоренность пантомимики
- д) верно а) и б)

28. ОСНОВНЫМИ ТИПАМИ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ

- а) непрерывно-прогredientного
- б) вялотекущей
- в) кататонической
- г) приступообразно-прогredientного
- д) рекуррентного

29. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

- а) возникновения в зрелом возрасте
- б) начала болезни с негативной симптоматикой
- в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза
- г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма
- д) тяжести конечных состояний

30. ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ХАРАКТЕРНО

- а) замедление ассоциативного процесса
- б) феномен соскальзивания и явление закупорки мышления
- в) обстоятельность
- г) ускорение ассоциативного процесса
- д) все перечисленное

31. ГИПЕРМЕТАМОРФОЗ ЭТО

- а) расстройство внимания в форме его непроизвольного кратковременного привлечения к обычно не замечаемым предметам и явлениям
- б) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
- в) замедление возникновения ассоциаций, уменьшение их количества
- г) нарушение способности соотносить возможности собственной личности с реальностью
- д) ложное, ошибочное восприятие реальных вещей или явлений, при котором отражение реального объекта сливаются с болезненным представлением

32. К ОТВЛЕЧЕННЫМ НАВЯЗЧИВОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ

- а) бесплодное мудрствование (умственная жвачка)
- б) навязчивое чувство антипатии
- в) навязчивое воспроизведение в памяти забытых имен, терминов и т.д.
- г) навязчивый счет
- д) навязчивое разложение на отдельные слоги различных слов

33. ТРЕВОЖНО-МНИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТУАНТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) отличаются большой впечатлительностью, огорчаются из-за любого пустяка
- б) бесконечного ощущения опасности за свое здоровье и здоровье близких
- в) повышенной способности к вытеснению и лживости

- г) склонности к пониженной самооценке, преувеличению собственных недостатков, неуверенности в своих силах
 д) чрезмерной опеки и ограждения своих детей и близких

34. К ОСОБЕННОСТАМ ДЕМОНСТРАТИВНЫХ АКЦЕНТУАНТОВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ

- а) повышенной способности к вытеснению, веры в свою ложь, потребности в признании
 б) им чуждо смущение, они принимают с величайшим удовольствием повышенный интерес со стороны окружающих
 в) склонности к самоанализу
 г) они умеют проникнуть в психологию других, приспособиться к другим
 д) они способны играть ту роль, которая нужна для данной ситуации, обладают пластичностью

35. ИНТРАВЕРТИРОВАННЫЕ АКЦЕНТУАНТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, ЧТО У НИХ НАБЛЮДАЕТСЯ

- а) преобладание мира представлений над непосредственными восприятиями и ощущениями
 б) склонность к синтетическому масштабному охвату событий и обобщению
 в) принятие решений после всестороннего взвешивания, предварительного обдумывания
 г) тенденция к аутизации
 д) все перечисленное

4.2. Ситуационные задачи для оценки компетенций УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6

Ситуационная задача 1.

| И | - | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ |
|---|---|---|
| у | - | Пациент М., 36 лет, инженер, работает в строительной компании. Н учил тяжелую травму головы. Был доставлен в фельдшерский пункт реанимации, предложено направление на госпитализацию, от которой бо Вернулся на рабочее место, но из-за сильной головной боли и кения работать не смог, был приведен домой. Головная боль не , вечером отмечалась рвота. Находился неделю на больничном, но й режим не соблюдал. Обнаружилось резкое расстройство памяти, в ной госпитализирован. Физическое состояние удовлетворительное. е органы без патологии. Неврологически: миоз, зрачки неправильн иничные нистагmoidные подергивания в правом крайнем отведении левая носогубная складка. Коленные и ахилловы рефлексы высокие, чем слева. Легкая левосторонняя гемианестезия. Менингеальных. Спинномозговая жидкость: белок 0,33%, плеоцитоз 25 (лимфоцитарное состояние: дезориентирован во времени и окружающей обстановкой называет 2006, 2013, 1998. При поправке повторяет за врачом и т Не может запомнить имя и отчество врача. Не находит свою палату, извольно называет блюда, из которых состоят завтрак, обед. Память как на ближайшие, так и на отдаленные события. Путает даты лично разному называет имя жены и детей. Не в состоянии объяснить смысла пословиц и поговорок, не понимает крылатых выражений имеются конфабуляции и псевдореминисценции. Склонен к плоским он настроения нестабильный. Пребыванием в стационаре не тяготит |
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Органический амнестический синдром в связи с травмой головного мозга. |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен неполностью: диагностирован на симптоматиче определено психическое расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| | | |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э | - | Диагноз выставлен на основании наличия нарушений памяти, выраженного дефицитом памяти на недавние события, снижением способности вспоминания прошлого опыта, наличие конфабуляций и псевдореминисценций. Наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы, непосредственно предшествовавшей развитию данного состояния |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован неполностью: не указаны диагностические критерии амнестического синдрома. |
| P0 | - | Диагноз обоснован неверно. |
| | | |
| B | 3 | Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. |
| Э | - | Целесообразно проведение МРТ с целью визуализации возможных органических изменений головного мозга. С целью выявления гемодинамических нарушений необходимо провести реоэнцефалографию, оценку динамики когнитивных функций – проведение оценочных тестов |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно. |
| | | |
| B | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациенту. |
| Э | - | Пациенту показано соблюдение постельного режима, назначение лекарственных препаратов, поддерживающих сердечно-сосудистую деятельность и дыхание. Показаны мероприятия, направленные на предупреждение и снижение отёков мозга, возбуждения – малые дозы транквилизаторов и антипсихотиков. Для улучшения когнитивных функций показаны ноотропы, витамины группы B, антиоксиданты, вещества, обладающие укрепляющего действия. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Ответ частично верный |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| | | |
| B | 5 | Являются ли приведенные в задаче психические нарушения обратимыми? Их течение может негативно сказаться на прогнозе заболевания? |
| Э | - | Психические нарушения при органическом амнестическом синдроме, имеющей органической этиологии считаются обратимыми. У лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, длительность психических нарушений значительно больше. |
| P2 | - | Ответ верный |
| P1 | - | Ответ частично верный |
| P0 | - | Ответ неверный |

Ситуационная задача 2.

| И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ | | |
|--|--|--|
| у - | | <p>Пациентка, 60 лет. Наследственность не отягощена. Анамнез собрал Заболевание началось с 58 лет и развивалось постепенно. Работала дей физики, по характеру была очень организованной, педантичной. Появление заболевания стала рассеянной, забывчивой, перестала справлять школе, а затем и с домашней работой.</p> <p>Первое время жаловалась на трудности с запоминанием имён, х номеров. Стала замечать, что не помнит события, происшедшие ранее, становилась все более и более забывчивой, не могла сосчитать даже покупки. Часто приходила домой без нужных вещей, несколько раз перестала готовить. Регулярно забывала выключать плиту или воду. В последнем году была не в состоянии выполнять обычную работу помощнику мужа.</p> <p>Состояние при осмотре: пациентка выглядит неопрятно, глаза широко раскрыты, мимика удивления, мигание редкое. Постоянно трёт руками бёдра, между ними, раскачивается. Во время разговора насторожена, к медперсоналу с недоверием. Ориентировка во времени и пространстве затруднена. Понимание речи сохранено, но ответы на вопросы неясные и неточные. Пациентка с трудом подбирает слова, говорит медленно, ждёт пауз.</p> <p>Не может вспомнить имена своих внуков, имена детей называет верно, не знает дату их рождения. Не помнит свой адрес, не ориентируется в месте проживания, имени президента/главы города назвать не может. Забывает три слова, названные с пятиминутным интервалом, не может даже с лёгким арифметическим заданием.</p> <p>Критика к своему состоянию отсутствует, больной себя не считает.</p> |
| B 1 | | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э - | | Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (F 00.0) |
| P2 - | | Диагноз поставлен верно. |
| P1 - | | Диагноз поставлен неполностью: диагностирован на симптоматическом уровне, не определено психическое расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 - | | Диагноз поставлен неверно. |
| B 2 | | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э - | | Диагноз поставлен на основании наличия снижения памяти, эпизодического анамнезом. Наличие ослабления критики и мышления. Наличие помрачения сознания. Наличие нарушения социального поведения, которые наблюдаются отчетливо на протяжении более 6 месяцев. Отсутствие другой возможной причины деменции. Раннее начало – возраст начала заболевания меньше 65 лет. |
| P2 - | | Диагноз обоснован верно. |
| P1 - | | Диагноз обоснован неполностью: не указаны диагностические критерии. |
| P0 - | | Диагноз обоснован неверно. |
| B 3 | | Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. |
| Э - | | Пациентке рекомендовано: для уточнения диагноза и определения характера заболевания МРТ головного мозга, чтобы определить наличие и степень поражения мозговых отделов коры. |

| | | |
|----|---|--|
| | | Сосудистые исследования: реоэнцефалография, чтобы выявить или нарушения мозгового кровообращения, МРТ в динамике лечения, чтобы вовремя корректировать дозировку, ять смену препарата. Также необходимо нейропсихологическое изение для определения степени нарушения той или иной психической |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно |
| B | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациентке. |
| Э | - | Пациентке показано назначение компенсаторной терапии для ия холинергического дефицита – ингибиторы холинэстеразы, блокаторов, Нейропротективная терапия: ноотропы, антиоксиданты. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Ответ частично верный |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| B | 5 | Определите прогноз заболевания, возможности лечения |
| Э | - | в силу раннего начала болезни, быстрого ухудшения состояния, (ме года). утрате профессиональных и повседневных навыков пациентк благоприятный. При адекватной терапии возможно замедление прогрессирования я и частичная коррекция когнитивных нарушений |
| P2 | - | Прогноз и возможности лечения указаны верно |
| P1 | - | Прогноз и возможности лечения указаны частично верно |
| P0 | - | Прогноз и возможности лечения указаны неверно |

Ситуационная задача 3.

| И | - | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ |
|---|---|--|
| у | - | Больной С., 34 лет. Из анамнеза известно: психическое состояние 1,5 года назад, когда "началась психологическая атака". Стал говорить, "собирают компромат". Замечал, что информация о нем известной другим людям. в разговорах окружающих слышал "намешанный" особые взгляды людей. Уволился с работы, "чтобы охранять т.к. считал, что в неё могут проникнуть, установить "жучки". Находил предметы (например, пуговицу), которые принимал за замаскированные устройства. Большую часть времени проводил дома, при этом постоянное воздействие: "искали слабое место", "вынуждали пойти". Позднее стал чувствовать влияние на свои мысли, тело. Замечал ость» своей психики: стал "хуже", "раздражительнее", "они могут меня", путать мысли». На высоте переживаний чувствовал себя "как злый", казалось, что "не властен над собой, как будто вселился дух со своими преследователями «внутренние диалоги», слышал, как «одного подчинения», считал, что «должен с ними договориться». При этом был напряжен, тревожен, подозрителен. Считал, что «среди врачей, подставные люди», искал скрытый смысл в задаваемых вопросах. состоянию не наблюдалось. |

| | | |
|----|---|--|
| | | |
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Шизофрения параноидная, непрерывное течение. Синдром Кандина |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен неполностью: диагностирован на симптоматиче определено психическое расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| | | |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э | - | Диагноз шизофрении установлен на основании следующих критери ости состояния с нарастанием симптомов в течение 1,5 лет, наличия ом статусе псевдогаллюцинаций, бреда преследования, воздействия, х психических автоматизмов, нарушений мышления по тическому типу, слаженности эмоциональных реакций, отсутствие переживанием. |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован неполностью: не указаны диагностические кри ти |
| P0 | - | Диагноз обоснован неверно. |
| | | |
| B | 3 | Составьте и обоснуйте план дополнительно обследования и диагностики пациента |
| Э | - | Пациенту должно быть проведено комплексное обследование с ем ЭЭГ, консультации невролога для исключения органической Необходимо также провести патопсихологическое обследование дл я расстройств невротического регистра и подтверждения эндогенно нейрокогнитивной дисфункции |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно |
| | | |
| B | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациенту. |
| Э | - | Пациенту показано стационарное лечение и медикаментозная корре я нарушений с использованием нейролептиков, т.к. ведущей является галлюцинаторная симптоматика. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Пациент нуждается в амбулаторном лечении нейролептиками. |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| | | |
| B | 5 | Через несколько месяцев регулярной терапии пациент не отмечает ного улучшения состояния. Какова Ваша дальнейшая лечебная такт |
| Э | - | Увеличение дозы принимаемого нейролептика, при неэффективнос тарат, перевод на атипичный нейролептик, либо применение метода я резистентности. |
| P2 | - | Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. |
| P1 | - | Тактика ведения пациента выбрана частично верно: нуждается в и дозы нейролептиков, присоединении транквилизаторов |

| | | |
|------------------------|---|---|
| P0 | - | Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно. |
| Ситуационная задача 4. | | |
| И | - | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ |
| У | - | Больной Р., Из анамнеза известно: Неоднократно госпитализирован в психиатрический стационар. В клинической картине – стойкие слуховые глюкоцинации, психические автоматизмы, бредовые идеи персекуторные, выраженные расстройства мышления в виде резонерства, якобинства. Госпитализации частые, по 2-3 раза в год, длительные, в которых сохраняется резидуальная бредовая симптоматика, нарастают эмоционально-волевые нарушения. Выписывается обычно по настоянию матери, даёт предпочтение народным методам терапии, в связи с чем пациент приём нейролептиков практически сразу после выписки. При этом был практически недоступен контакту из-за негативизма и выраженных расстройств мышления. Говорил о том, что его "давно уже должны были вывезти в Америку, там ждут моего приезда". Позднее рассказал, что люди нуждаются в его помощи в выборах президента», «вся политика под контролем, они играют по моим правилам». Среди больных узнавал, что ФСБ и ЦРУ, уверял, что у него «миллионы долларов на счету», хотел подарить «особняки и машины», говорил, что получил Золотую премию. Фон настроения был повышен, речь по типу монолога, в выражениях амбивалентен. К переживаниям без критики. |
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Шизофрения параноидная непрерывного течения. Парафренный синдром. |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен на симптоматическом уровне, не определено основное расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э | - | Диагноз шизофрении установлен на основании следующих критериев: постоянного состояния с нарастанием симптомов. Наличие в психическом состоянии глюкоцинаций, психических автоматизмов, бреда преследования, бреда оправдания, нарушений мышления по шизофреническому типу, эмоциональных расстройств, отсутствия критики к переживаниям. |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован частично: не указаны диагностические критерии. |
| P0 | - | Диагноз обоснован неверно. |
| B | 3 | Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. |
| Э | - | Пациенту должно быть проведено комплексное обследование с помощью ЭЭГ, консультации невролога для исключения органической патологии. Необходимо также провести <u>патопсихологическое обследование</u> для выявления расстройств невротического регистра и подтверждения эндогенной патологии, а также гипо- или гиперфункции лобных долей мозга. |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |

| | | |
|----|---|--|
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно |
| B | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациенту. |
| Э | - | Пациенту показано стационарное лечение и медикаментозная коррекция нарушений с использованием нейролептиков, т.к. ведущей является галлюцинаторная симптоматика. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Пациент нуждается в амбулаторном лечении нейролептиками. |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| B | 5 | Через несколько месяцев регулярной терапии пациент не отмечаетного улучшения состояния. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика? |
| Э | - | Увеличение дозы принимаемого нейролептика, при неэффективности которого, перевод на атипичный нейролептик, либо применение метода резистентности. |
| P2 | - | Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. |
| P1 | - | Тактика ведения пациента выбрана частично верно: нуждается в увеличении дозы нейролептиков, присоединении транквилизаторов. |
| P0 | - | Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно. |

Ситуационная задача 5.

| | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ |
|---|---|--|
| И | - | <p>Больная Н., 27 лет, служащая. Анамнез жизни: Наследственность не отягощена. Родила и развивалась нормально, окончила школу и институт, получив специальность.</p> <p>По характеру спокойная, общительная, ответственная. Употребление алкоголя не приемлемо.</p> <p>Анамнез заболевания: Со слов больной, впервые заболела в 16 лет, когда появилось снижение настроение, тоска, отсутствие желания учиться и встречаться с друзьями. Появился снизился аппетит, была заторможенной и медлительной, «не могла ни с кем поговорить», обвиняла себя в «лени и глупости», высказывала различные мысли.</p> <p>Была госпитализирована в психиатрическую клинику, стационарно на протяжении 3 месяцев, затем амбулаторно около года.</p> <p>После улучшения состояния окончила школу, поступила в институт, работала официанткой.</p> <p>Второй эпизод в возрасте 21 года: постепенно снизилось настроение, чувство тоски, снизился аппетит, ухудшился сон, стала пропускать занятия, не общалась с друзьями. Была повторно госпитализирована в психиатрическую клинику, лечилась стационарно 3 месяца.</p> <p>После нормализации состояния окончила институт, работала по специальности.</p> <p>На настоящий момент ухудшение около трех месяцев, когда стала подавленной, малоразговорчивой, малоактивной, часто отказывалась от еды, жаловалась на головные боли, сон, тоску, отсутствие желания заниматься чем-либо, трудности с концентрацией, запоры и головные боли. Обвиняла себя в том, что «создает проблемы окружающим», «на работе отчет, а я здесь – все им испортила». С целом</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>тва приняла большую дозу транквилизаторов, родственниками была МП.</p> <p>Психический статус: Настроение снижено. Больная заторможена, на, на вопросы отвечает однозначно, после паузы. Голос тихий. Сиди , опустив голову, мимика однообразная, скорбная.</p> <p>Жалуется на тоску, плохой сон, отсутствие аппетита, повторяет «все », «лучше бы меня и вовсе не было». Высказывает суицидальные мыс одственников в том, что «не дали закончить».</p> <p>Соматический статус: Сниженного питания, за 2 месяца похудела на 1, тонус снижен. Зрачки расширены. Страдает запорами.</p> |
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий тяжелый депресс |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен не полностью: неверно оценена тяжесть депрессии |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный вами диагноз? |
| Э | - | <p>Диагноз тяжелого депрессивного эпизода поставлен на основе критериям МКБ-10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение настроение, 2. Ангедония (утрата интересов и удовольствий), 3. Снижение активности, <p>А также дополнительных симптомов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушенный сон, 2. Сниженный аппетит, 3. Снижение способности к сосредоточению и вниманию, 4. Идеи виновности, 5. Попытка суицида. <p>Диагноз рекуррентного депрессивного расстройства поставлен на данных анамнеза (два предшествующих депрессивных эпизода и текущий эпизод умеренной степени тяжести).</p> |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован не полностью: отсутствует обоснование синдрома я. |
| P0 | - | Обоснование полностью не верно. |
| B | 3 | Может ли данная пациентка быть госпитализирована в недобровольно сли да, то на каком основании. |
| O | - | <p>Пациента может быть госпитализирована в психиатрическую клиникульно в соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от N 3185-1 (ред. от 03.07.2016), статья 29, пункт а и в, так как пациента гвенную опасность для себя (совершена попытка суицида, высказывания мысли) и существенный вред ее здоровью будет нанесен вследс психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатриче</p> <p>Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 03.07.2016) "О психиатрических гарантиях прав граждан при ее оказании"</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Статья 29. Основания для госпитализации в медицинскую организацию психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.</p> <p>Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть помещено в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного представителя до постановления судьи, если его психическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях. Помещение лица с психическим расстройством является тяжелым и обуславливает:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. |
| P2 | - | Ответ дан полностью верно. |
| P1 | - | Обоснование госпитализации дано не полностью, не указаны пункты а, б, в. |
| P0 | - | Ответ дан не верно. |
| | | |
| B | 4 | Препараты какой группы вы бы рекомендовали пациенту в качестве терапии? Обоснуйте свой ответ. |
| Э | - | Так как пациента страдает от рекуррентного депрессивного расстройства, в данный момент имеет симптомы депрессивного эпизода средней степени тяжести, в качестве основной терапии ей показаны антидепрессанты. Препаратами являются современные антидепрессанты с минимальными побочными эффектами - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИЗС): сертралин, флуоксамин, циталопрам, пароксетин. |
| P2 | - | Выбраны верные группы препаратов, обоснование верное. |
| P1 | - | Ответ дан не полностью: выбрана верная группа препаратов, но не обосновано. |
| P0 | - | Ответ неверный: выбрана не правильная группа препаратов. |
| | | |
| B | 5 | С какими состояниями вы бы провели дифференциальный диагноз? Обоснуйте свой ответ. |
| Э | - | Рекуррентное депрессивное расстройство необходимо дифференцировать от других аффективных расстройств (имеют место эпизоды манией или гипомании), депрессивного синдрома при шизофрении (выявляются негативные симптомы шизофрении). |
| P2 | - | Ответ дан полностью верно. |
| P1 | - | Ответ дан не полностью: дифференциальный диагноз проведен не полностью или проведен только с одним заболеванием. |
| P0 | - | Ответ неверный: дифференциальный диагноз не проведен. |

Ситуационная задача 6.

| Вид | Код | Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса |
|-----|--------|---|
| | | |
| H | - | 006 |
| Ф | A/01.7 | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза |
| Ф | A/02.7 | Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного лечения |

| | | |
|-----|---|---|
| ... | | |
| И | - | ИНСТРУКЦИЯ |
| у | - | <p>Мужчина, 37 лет, военнослужащий.</p> <p>Анамнез: Служил в «горячих точках» в должности командира взвода. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Во время одной из подразделение попало в засаду, многие его сослуживцы погибли, сам жалею ранение, длительное время лечился.</p> <p>Через несколько месяцев после ранения его стали беспокоить ночные страхи, навязчивые воспоминания со сценами боевых действий. Стал раздражительным, напряженным, с трудом сдерживал приступы агрессии. Обратился к врачу по настоянию жены в связи с приступами я и агрессии.</p> <p>При осмотре: Настроение снижено, раздражительный, вспыльчивый. Жалобы на своих навязчивых воспоминаниях, кошмарах, воспроизводящих ли его сослуживцев. Жалуется на нарушения сна, приступы сердцебиения, сопровождаемые страхом, постоянное чувство внутреннего напряжения. Пытается снимать алкоголем. Рассказывает, что «чувствует себя чужим», не чувствует удовольствия от привычных занятий, «не может жить в жизни».</p> |
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Посттравматическое стрессовое расстройство. |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен не полностью: не оценена этиология заболевания. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный вами диагноз? |
| Э | - | <p>Диагноз поставлен на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данных анамнеза (связь с тяжелым стрессом, симптомы появились месяцах после него); - данных психического статуса (настроение сниженное, пациент раздражительный, вспыльчивый, жалобы на навязчивые воспоминания, кошмары, воспроизводящие сцены сражений, чувство внутреннего напряжения, нарушения социальной жизни, употребление алкоголя с целью снятия внутреннего напряжения). |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован не полностью: не указана связь с тяжелым стрессом. |
| P0 | - | Обоснование полностью не верно. |
| B | 3 | Составьте и обоснуйте план лечения, включающий медикаментозные и немедикаментозные методы. |
| O | - | <p>Лечение посттравматического стрессового расстройства включает в себя медикаментозные и немедикаментозные методы лечения.</p> <p>Для лечения депрессивной симптоматики используют антидепрессанты – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; нарушений тревоги – транквилизаторы бензодиазепинового ряда.</p> <p>Немедикаментозные методы включают в себя психотерапию:</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | Релаксационные методы, когнитивно-поведенческая психотерапия, льная и групповая психотерапия. |
| P2 | - | Ответ дан полностью верно. |
| P1 | - | Ответ дан частично, не указана психотерапевтическая помощь. |
| P0 | - | Ответ дан не верно. |
| | | |
| B | 4 | Какой прогноз при данной патологии? |
| Э | - | ПТСР является труднокурабельной патологией. При соответствующем прогноз является благоприятным, однако некоторые симптомы могут я в течение всей жизни, затрудняя социализацию. При отсутствии лечения прогноз неблагоприятный, нарастает социальные нарушения поведения, зачастую имеет место злоупотребление алкогольными препаратами. |
| P2 | - | Ответ дан полностью. |
| P1 | - | Ответ дан не полностью. |
| P0 | - | Ответ неверный полностью. |
| | | |
| B | 5 | С какими состояниями вы бы провели дифференциальный диагноз? свой ответ. |
| Э | - | Дифференциальную диагностику следует проводить с генерализованным расстройством, депрессивным расстройством, фобиями. Основным критерием является взаимосвязь с психологической травмой и я симптоматика. |
| P2 | - | Ответ дан полностью. |
| P1 | - | Ответ дан не полностью: дифференциальный диагноз проведен не или проведен только с одним заболеванием. |
| P0 | - | Ответ неверный: дифференциальный диагноз не проведен. |

Ситуационная задача 7.

| И | - | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ |
|---|---|--|
| У | - | Мужчина, 41 год, в течение 2-х лет повторно обращается в медицинская ко врачам различных специальностей с требованием медицинскихий и с жалобами на головную боль, боль в спине, в суставах, в животе, в груди, неприятные ощущения в горле, головокружение, общую слабость. Пациент был про консультирован терапевтом, кардиологом, эндокринологом, гастроэнтерологом, отоларингологом, мануальным терапевтом, ревматологом. За время наблюдения при многократных обследованиях установлено объективных доказательств наличия соматической или психической патологии. Лечение у терапевта и невролога не дает значительного результата. Из-за своей болезни пациент был вынужден уйти на работу с болезнью. Пациент не видит связи между возникновением своего заболевания и ситуацией. |

| | | |
|----|---|--|
| | | |
| В | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Соматизированное расстройство. |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен неполностью: диагностирован на симптоматиче определено психическое расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| | | |
| В | 2 | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э | - | Диагноз соматизированного расстройства установлен на основании обращений пациента с многочисленными разнообразными лыми соматическими жалобами, в сочетании с требованиями их обследований, несмотря на наличие объективных доказательств соматической болезни. Длительность расстройства не менее 2-х лет и которых не было выявлено сколько-нибудь значительной физической болезни. Расстройство вызывает нарушение социальной адаптации. Характерение симптомов на фоне тяжело переживаемой ситуации и исключение возможности психологической обусловленности симптоматики. |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован неполностью: не указаны диагностические критерии соматического расстройства. |
| P0 | - | Диагноз обоснован неверно. |
| | | |
| В | 3 | Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациен |
| Э | - | Пациент был обследован врачами различных специальностей в течение рекомендовано предоставить результаты проведенных обследований. Необходимо провести исследование структуры личности и психологическое обследование для исключения аффективных, тревожных расстройств. |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно. |
| | | |
| В | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациенту. |
| Э | - | Пациенту показано патогенетическое психотерапевтическое лечение соматоформным расстройством. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Пациент нуждается в повторных обследованиях для исключения психической и неврологической патологии, медикаментозном лечении у невролога (спазмолитики, успокаивающие препараты, ноотропы) и санаторно-курортном лечении. |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| | | |
| В | 5 | Через несколько месяцев регулярной психотерапии пациент не отмечает улучшения состояния. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика? |
| Э | - | Назначение психотропных препаратов, рекомендованных в соответствии для лечения соматоформных расстройств: антидепрессантов (против депрессии, из группы СИОЗС), мягких нейролептиков. |

| | | |
|----|---|--|
| P2 | - | Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. |
| P1 | - | Тактика ведения пациента выбрана частично верно: нуждается в прозаторов, успокаивающих, ноотропов. |
| P0 | - | Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно. |

Ситуационная задача 8.

| ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ НА ВОПРОСЫ | | |
|--|---|---|
| у | - | K неврологу обратилась женщина 26 лет с жалобами на эпизоды сибирдцебиением, головокружением, подъемом АД, чувством нехватки воздуха, ознобом, потливостью, трепором рук, страхом внезапной смерти с ума. Впервые испытала приступ тревоги, когда была единственным простудой ребенком и очень переживала за его здоровье. Тревога внезапно на фоне полного благополучия, достигает максимума за 10 минут, обычно не более 20-30 мин. Снимается приемом 10 мг анатриллина или под язык. Приступы возникают в течение последних 2-х мес. 2-3 раза при возникновении приступа часто вызывает скорую помощь. Боится дома одна из-за страха повторения приступов тревоги. |
| B | 1 | Предположите наиболее вероятный диагноз. |
| Э | - | Паническое расстройство. |
| P2 | - | Диагноз поставлен верно. |
| P1 | - | Диагноз поставлен неполностью: диагностирован на симптоматиче определено психическое расстройство в соответствии с МКБ-10. |
| P0 | - | Диагноз поставлен неверно. |
| B | 2 | Обоснуйте поставленный Вами диагноз. |
| Э | - | Диагноз панического расстройства установлен на основании жалоб на повторные непредсказуемые приступы выраженной тревоги (панного месяца, которые возникают при обстоятельствах, не связанных с угрозой, не ограничиваются предсказуемой ситуацией, и между ними есть свободные от тревоги периоды. Приступы сопровождаются такими вегетативными расстройствами, страхом смерти, сумасшествия и избегает ситуацию, в которой паническая атака возникла впервые. Важны вторичные страхи остаться одной, повторных панических атак). |
| P2 | - | Диагноз обоснован верно. |
| P1 | - | Диагноз обоснован неполностью: не указаны диагностические критерии расстройства. |
| P0 | - | Диагноз обоснован неверно. |
| B | 3 | Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. |
| Э | - | Пациентке рекомендовано: ЭКГ, ЭЭГ, рентгенография легких и шеи, УЗИ брюшной полости, консультации невролога, терапевта для исключения неврологической и соматической патологии (щитовидной железы и надпочечников). Необходимо провести исследование структуры личности и психическое обследование . |
| P2 | - | План дополнительного обследования составлен полностью верно. |
| P1 | - | План дополнительного обследования составлен частично верно. |
| P0 | - | План дополнительного обследования составлен полностью неверно. |

| | | |
|----|---|---|
| B | 4 | Определите и обоснуйте тактику оказания помощи пациентке. |
| Э | - | Пациентке показано патогенетическое психотерапевтическое лечение, направленное на коррекцию невротическим расстройством. |
| P2 | - | Ответ верный. |
| P1 | - | Пациентка нуждается в медикаментозном лечении у невролога (анксиолитики, успокаивающие препараты, ноотропы) и санаторно-курортном лечении. |
| P0 | - | Ответ неверный. |
| | | |
| B | 5 | Через несколько месяцев регулярной психотерапии пациентка не получила существенного улучшения состояния. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика? |
| Э | - | Назначение психотропных препаратов, рекомендованных в соответствующей для лечения панического расстройства: современных антидепрессантов из группы СИОЗС, мягких нейролептиков. |
| P2 | - | Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. |
| P1 | - | Тактика ведения пациента выбрана частично верно: нуждается в приеме антидепрессантов, успокаивающих, ноотропов. |
| P0 | - | Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно. |

5. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

5.1 Перечень тестовых заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности: тестовые задания по разделам дисциплины.

5.1.1 Тестовые задания к зачету по дисциплине «Психиатрия»:

| Тестовые задания | Код компетенции (согласно РПД) |
|--|--------------------------------|
| <p>1. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА ИМЕЮТ ПРАВО ЗАПРАШИВАТЬ</p> <p>а) никому не дано такого права</p> <p>б) соседи</p> <p>в) его сотрудники по работе</p> <p>г) судебно-следственные органы и вышестоящие органы здравоохранения</p> <p>д) участковые врачи территориальных поликлиник</p> | УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6 |
| <p>2. СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ДАЕТСЯ</p> <p>е) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в письменной форме</p> <p>ж) самим лицом, страдающим психическим расстройством, в устной форме</p> <p>з) его законным представителем в письменной форме</p> <p>и) его законным представителем в устной форме</p> <p>к) другими близкими родственниками</p> | |
| <p>3. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ИМЕЮТ</p> | |

- | | |
|---|--|
| <p>е) все лица без исключения</p> <p>ж) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением</p> <p>з) только госпитализированные в недобровольном порядке</p> <p>и) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера</p> <p>к) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера, а также тех, кто госпитализируется в недобровольном порядке</p> <p>4. ПРИ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО, В НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ, РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ БОЛЬНОГО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ</p> <p>е) врачом-психиатром единолично</p> <p>ж) только комиссией врачей-психиатров</p> <p>з) только санкции прокурора</p> <p>и) только по постановлению суда</p> <p>к) только по разрешению главного психиатра</p> <p>5. СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ ОТ БОЛЬНОГО ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ</p> <p>д) только в начале курса терапии</p> <p>е) при каждом и любом изменении первоначальной схемы терапии</p> <p>ж) в начале курса терапии, а также при смене метода терапии и таких изменениях в лечении, которые связаны с существенным возрастанием риска побочных эффектов и осложнений</p> <p>з) при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар</p> <p>при проведении принудительного лечения</p> <p>6. НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БОЛЬНОГО, СОСТОЯЩЕГО ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ</p> <p>е) только с разрешения главного врача диспансера</p> <p>ж) только с разрешения главного психиатра данной территории</p> <p>з) только санкции судьи</p> <p>и) только санкции прокурора</p> <p>к) по единоличному решению врача-психиатра, без получения чьего-либо разрешения</p> <p>7. ВЫПИСКА ПАЦИЕНТА, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПРОИЗВОДИТСЯ</p> <p>е) по его личному заявлению</p> <p>ж) по единоличному решению лечащего врача</p> <p>з) по заключению комиссии врачей-психиатров либо по постановлению судьи об отказе в продлении недобровольной госпитализации</p> <p>и) по просьбе родственников</p> <p>к) по решению главного врача психиатрического стационара</p> | |
|---|--|

8. ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД ПО ВОПРОСУ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЦА В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДАЕТСЯ

- е) родственниками лица
- ж) участковым психиатром
- з) представителем психиатрического учреждения, в котором находится лицо
- и) комиссией врачей-психиатров
- к) ни одно из перечисленных

9. РЕШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО

- е) врачом любой специальности
- ж) фельдшером станции скорой медицинской помощи
- з) только врачом-психиатром
- и) органом управления здравоохранением
- к) ни одним из перечисленных

10. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ЯВЛЯЕТСЯ

- д) его просьба или согласие
- е) согласие обоих родителей и решение органа опеки и попечительства
- ж) просьба или согласие его законного представителя, а при отсутствии такового решение органа опеки и попечительства
- з) просьба или согласие его дальнего родственника

11. АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) физической истощаемости
- б) психической истощаемости
- в) фиксационной амнезии
- г) аффективной лабильности
- д) вегетативными расстройствами

12. КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИВНАЯ ТРИАДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а) эмоциональным торможением
- б) двигательным торможением
- в) идеаторным торможением
- г) всем перечисленным
- д) ничем из перечисленного

13. К СОМАТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕПРЕССИИ ОТНОСЯТСЯ

- а) запоры
- б) дисменорея
- в) похудание
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

| | |
|--|--|
| <p>14. ЧТО ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В КЛИНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНЫХ С «МАСКИРОВАННЫМИ ДЕПРЕССИЯМИ»</p> <ul style="list-style-type: none"> а) нарушения мимики и пантомимики б) пониженное настроение в) интеллектуально-мнестические нарушения г) изменения личности д) соматовегетативные функциональные расстройства <p>15. МАНИАКАЛЬНАЯ ТРИАДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) повышенным настроением б) ускорением ассоциаций в) двигательным возбуждением г) всем перечисленным д) ничем из перечисленного <p>16. ОБСЕССИВНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений, двигательных актов и т.д. помимо желания б) сознанием их болезненности, критическим отношением к ним в) бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих страданий г) всем перечисленным д) ничем из перечисленного <p>17. НАВЯЗЧИВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) появления вопреки разуму, воли и чувству б) стремления совершать какое-либо бессмысленное, часто опасное действие в) острого овладения рассудком, подчиняя себе все поведение больного г) возникновения при этом страха, связанного также с непонятностью появления чуждого влечения д) чувством навязанности, сделанности из вне <p>18. НАВЯЗЧИВЫЙ СТРАХ (ФОБИЯ) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) неопределенного чувства страха, без понимания его бессмысленности б) понимания его бессмысленности, попытками справиться с ним в) наличия конкретного содержания г) интенсивного и непреодолимого страха, охватывающего больного д) возможности быть всеохватывающим <p>19. ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПСИХОПАТИИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) на легкие - с хорошими компенсаторными механизмами | |
|--|--|

- б) на выраженные - с частой декомпенсацией
 в) на глубокие - вариант патологического развития при психопатии
 г) на все перечисленные
 д) все перечисленное неверно

20. К ПРИЗНАКАМ РЕАКТИВНЫХ ПСИХОЗОВ ОТНОСЯТСЯ

- а) содержание психоза отражает психическую травму
 б) без психотравмы психоза бы не было
 в) с исчезновением причин проходит психоз
 г) все перечисленные
 д) верно а) и в)

21. АФФЕКТИВНО-ШОКОВЫЕ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) наиболее острыми формами реактивных психозов, сопровождающимися резкими эндокринными и вазомоторными сдвигами
 б) состояниями, возникающими в связи с внезапными чрезмерными по силе потрясениями
 в) состояниями, протекающими в гипер- и гипокинетической формах
 г) верно б) и в)
 д) всем перечисленным

22. РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) патологической реакцией на психические травмы или неблагоприятные ситуации
 б) патологической реакцией психотического уровня
 в) развитие их зависит от конституциональных особенностей личности, перенесенных заболеваний, физического состояния и возраста
 г) все перечисленное верно
 д) все перечисленное неверно

23. ДЛЯ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА, КРОМЕ

- а) неврозоподобных расстройств
 б) бредовых расстройств
 в) галлюцинаторно-бредовых расстройств
 г) судорожного синдрома
 д) верно а) и г)

24. СПЕЦИФИЧЕСКИМИ, ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ ТОЛЬКО ПРИ ШИЗОФРЕНИИ, ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАССТРОЙСТВА

- а) синдром Кандинского - Клерамбо
 б) псевдогаллюцинации
 в) интерпретативный бред
 г) все перечисленные
 д) ничего из перечисленного

- | | |
|---|--|
| <p>25. ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ (НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ) ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) снижения энергетического потенциала б) эмоционального обеднения в) нарастающей интравертированности г) утраты единства психических процессов д) тугоподвижности, замедленности всех психических процессов <p>26. ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) на юношеский возраст б) на детский возраст в) на зрелый возраст г) на период инволюции д) на поздний возраст <p>27. ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ СВОЙСТВЕННЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций в) "стальной" блеск глаз г) замедленность или ускоренность пантомимики д) верно а) и б) <p>28. ОСНОВНЫМИ ТИПАМИ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) непрерывно-прогредиентного б) вялотекущей в) кататонической г) приступообразно-прогредиентного д) рекуррентного <p>29. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> а) возникновения в зрелом возрасте б) начала болезни с негативной симптоматикой в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма д) тяжести конечных состояний <p>30. ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ХАРАКТЕРНО</p> <ul style="list-style-type: none"> а) замедление ассоциативного процесса б) феномен соскальзивания и явление закупорки мышления в) обстоятельность г) ускорение ассоциативного процесса д) все перечисленное | |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>31. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ</p> <p>а) внутримышечное введение 10% гексенала - 1 грамм б) внутривенное медленное введение 10% гексенала - 1 грамм в) внутривенное введение 10 мл 25% раствора сульфата магния на глюкозе г) все перечисленное д) верно б) и в)</p> <p>32. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СУМЕРЕЧНОМ ПОМРАЧЕНИИ СОЗНАНИЯ, РАЗВИВШЕМСЯ ПОСЛЕ ПАРОКСИЗМА, ВКЛЮЧАЕТ</p> <p>а) лечение пароксизмов б) внутримышечно или внутривенно диазепам в возрастающих дозах в) фенотиазиновые производные - аминазин, тизерцин г) все перечисленное д) верно а) и б)</p> <p>33. ФАКТОРАМИ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ</p> <p>а) массивности депрессий б) наличия суицидальных мыслей в) наличия массивных идей самообвинения г) массивного двигательного торможения д) малой выраженности двигательного торможения в массивной депрессии</p> <p>34. СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ВЫРАЖАЕТСЯ</p> <p>а) в мыслях о бесцельности существования б) в высказываниях о безвыходности ситуации, отсутствии надежд на излечение в) в суицидальных мыслях г) ни в чем из перечисленного д) во всем перечисленном</p> <p>35. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ</p> <p>а) в устранении или смягчении стрессовых ситуаций б) в психотерапевтических мероприятиях в) в назначении необходимого лечения г) во всем перечисленном д) ни в чем из перечисленного</p> <p>36. ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РЕАКТИВНОГО ПСИХОЗА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКУЮ, КОГДА</p> <p>а) поведение больных теряет целенаправленность</p> | |
|--|--|

- б) на фоне быстро нарастающей тревоги и страха возникает хаотическое психомоторное возбуждение с беспорядочными движениями
 в) нарушена ориентировка в окружающем (суженное сознание или истерическое сумеречное помрачение)
 г) верно все перечисленное
 д) все перечисленное неверно

37. РАЗНОВИДНОСТЯМИ ГИПОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) аффектогенный ступор
 б) ступор с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями
 в) вялоапатический ступор
 г) все перечисленное
 д) ничего из перечисленного

38. ДЕПРЕССИВНЫЙ СТУПОР ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

- а) невротической депрессии
 б) маниакально-депрессивном психозе
 в) патохарактерологических реакциях
 г) формирующейся психопатии
 д) неврозе навязчивых состояний

39. АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) проявлений раздражительной слабости
 б) аффективной лабильности
 в) явлений "усталости, не ищущей себе покоя"
 г) ментизма
 д) головных болей и вегетативных нарушений

40. МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ РАПТУС ЭТО

- а) не сопровождающаяся потерей сознания кратковременная, пароксизмально наступающая утрата мышечного тонуса, приводящая к падению больного
 б) двигательное возбуждение с преобладанием двигательных и речевых стереотипий
 в) расстройство поведения, выражющееся борьбой против мелких иногда мнимых обид, но не достигающее бредового поведения
 г) периодически и внезапно возникающая страсть к воровству
 д) двигательное возбуждение, возникающее на фоне мучительной, невыносимой тоски, сочетающееся с безысходностью и отчаянием

41. ГИПЕРМЕТАМОРФОЗ ЭТО

- а) расстройство внимания в форме его непроизвольного кратковременного привлечения к обычно не замечаемым предметам и явлениям

- б) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
 в) замедление возникновения ассоциаций, уменьшение их количества
 г) нарушение способности соотносить возможности собственной личности с реальностью
 д) ложное, ошибочное восприятие реальных вещей или явлений, при котором отражение реального объекта сливаются с болезненным представлением

42. К ОТВЛЕЧЕННЫМ НАВЯЗЧИВОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ

- а) бесплодное мудрствование (умственная жвачка)
 б) навязчивое чувство антипатии
 в) навязчивое воспроизведение в памяти забытых имен, терминов и т.д.
 г) навязчивый счет
 д) навязчивое разложение на отдельные слоги различных слов

43. ТРЕВОЖНО-МНИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТУАНТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ

- а) отличаются большой впечатлительностью, огорчаются из-за любого пустяка
 б) бесконечного ощущения опасности за свое здоровье и здоровье близких
 в) повышенной способности к вытеснению и лживости
 г) склонности к пониженнной самооценке, преувеличению собственных недостатков, неуверенности в своих силах
 д) чрезмерной опеки и ограждения своих детей и близких

44. К ОСОБЕННОСТЯМ ДЕМОНСТРАТИВНЫХ АКЦЕНТУАНТОВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ

- а) повышенной способности к вытеснению, веры в свою ложь, потребности в признании
 б) им чуждо смущение, они принимают с величайшим удовольствием повышенный интерес со стороны окружающих
 в) склонности к самоанализу
 г) они умеют проникнуть в психологию других, приспособиться к другим
 д) они способны играть ту роль, которая нужна для данной ситуации, обладают пластичностью

45. ИНТРАВЕРТИРОВАННЫЕ АКЦЕНТУАНТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, ЧТО У НИХ НАБЛЮДАЕТСЯ

- а) преобладание мира представлений над непосредственными восприятиями и ощущениями
 б) склонность к синтетическому масштабному охвату событий и обобщению
 в) принятие решений после всестороннего взвешивания, предварительного обдумывания

- | | |
|--|--|
| г) тенденция к аутизации д) все перечисленное | |
|--|--|

6. Критерии оценивания результатов обучения

Для зачета

| Результаты обучения | Критерии оценивания | |
|---|---|---|
| | Не зачтено | Зачтено |
| Полнота знаний | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Могут быть допущены несущественные ошибки |
| Наличие умений | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи, выполнены все задания. Могут быть допущены несущественные ошибки. |
| Наличие навыков (владение опытом) | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач. Могут быть допущены несущественные ошибки. |
| Мотивация (личностное отношение) | Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют | Проявляется учебная активность и мотивация, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи. |
| Характеристика сформированности компетенции | Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение | Сформированность компетенции соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Низкий | Средний/высокий |

Для тестирования:

Оценка «5» (Отлично) - баллов (100-90%)

Оценка «4» (Хорошо) - балла (89-80%)

Оценка «3» (Удовлетворительно) - балла (79-70%)

Менее 70% – Неудовлетворительно – Оценка «2»

Разработчик:

Касимова Лала Наримановна, зав. кафедрой психиатрии, д.м.н., профессор

Дата « » 2023 г.