федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# ПРОЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 2 ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ)

Специальность <u>31.08.47 Рефлексотерапия</u> *код, наименование* 

Кафедра: медицинской реабилитации

Форма обучения: очная

### 1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по практике «Производственная (клиническая) практика 2 Обучающий симуляционный курс (специальные профессиональные умения и навыки)» является неотъемлемым приложением к рабочей программе практики «Производственная (клиническая ) практика 2 Обучающий симуляционный курс (специальные профессиональные умения и навыки)». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной практике.

#### 2. Перечень оценочных средств

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по практике Производственная (клиническая ) практика 2 Обучающий симуляционный курс (специальные профессиональные умения и навыки)используются следующие оценочные средства:

|              | дотва.                |  |   |
|--------------|-----------------------|--|---|
| №<br>п/<br>п | Оценочное<br>средство | Краткая характеристика оценочного средства   | Представление оценочного средства в ФОС |
| 1            | Кейс-задания          | Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы | решения кейс-<br>задания                |

### 3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и видов оценочных средств

| Код и формулировка компетенции  | Этап<br>формировани<br>я<br>компетенции | Контролируемые разделы практики  | Оценочные средства |
|---|---|--|--------------------|
| ПК 1, ПК 2,<br>ПК-3,ПК 4, ПК-<br>5, ПК-6, ПК-7,<br>ПК-8, ПК-9, ПК-<br>11, ПК-12 | Текущий                                 | Раздел 1. «Классические и современные методы и способы рефлекторного воздействия на биологические активные точки и зоны». Раздел 2. «Неотложные состояния в рефлексотерапиире» | Кейс-задания       |
| ПК 1, ПК 2,<br>ПК-3,ПК 4, ПК-<br>5, ПК-6, ПК-7,<br>ПК-8, ПК-9, ПК-<br>11, ПК-12 | Промежуточ<br>ный                       | Все разделы практики   | Кейс-задания       |

#### 4. Содержание оценочных средств входного, текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем практики при проведении занятий в форме кейс заданий.

4.1. Кейс задания для оценки компетенций: ПК 1, ПК 2, ПК-3,ПК 4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12

| Вид | Код    | Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-<br>кейса   |
|-----|--------|--|
| Н   |        | 001  |
| Ф   | C/01.8 | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии   |
| Φ   | C/02.8 | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями   |
| И   | -      | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ<br>РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  |
| У   | -      | У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие после еды.  |
| В   | 1      | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.  |
| Э   | -      | Задачи рефлексотерапии: купирование боли, воспаления, улучшение трофики.   |
| P2  | -      | Задачи перечислены в полном объеме.  |
| P1  | _      | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).  |
| P0  | -      | Задачи перечислены неверно.  |
| В   | 2      | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.   |
| Э   | -      | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия. |
| P2  | -      | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме   |
| P1  | -      | Методы РТ перечислены в неполном объеме  |
| P0  | -      | Методы РТ перечислены неправильно  |
| В   | 3      | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа.  Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.                               |

| появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  К концу курса, при купировании болевого синдрома, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно холу энергии канала, зона небольшой гиперемии вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.  На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).  Р2 - Способы воздействия указаны верно и подробно.  Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (Е-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желчного пузыря (VB-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р3 - Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной итлотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного |     |        |   |
|--|-----|--------|---|
| Р1 - Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  Р0 - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (Е-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—полжелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желчного пузыря (VB-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  и - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по  | Э   | -      | скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при купировании болевого синдрома, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, зона небольшой гиперемии вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1- |
| РО - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (Е-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желчного пузыря (VВ-24), переднесрединного (Ј-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р2 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Р3 - Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  С702.8 Проведение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  С702.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  В 3 - Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  В 3 - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  В 6 - Вегетососудистая дистония по                             | P2  | -      | Способы воздействия указаны верно и подробно.   |
| РО - Способы воздействия указаны неверно.  В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (Е-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желуного пузыря (VВ-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотераписй проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (ПІэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р2 - Аурикулярные точки перечислены с опиибками.  Н - ОО2  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  С/02.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегегососудистая дистония по       | P1  | -      | • • •   |
| В 4 Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  Используемы в лечении данной патологии.  (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желчного пузыря (VB-24), переднеерединного (J-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  Р0 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперетная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р2 - Аурикулярные точки перечислены ошибками.  Р3 - Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  В С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  В С/02.8 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  В С/02.8 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  В С/02.8 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями   | P0  | _      | 1   |
| В 4 используемы в лечении данной патологии.  Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (E-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (ТR-6), желчного пузыря (VB-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).  Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме. Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (ППэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме. Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р2 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Р2 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Р3 - Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Ф С/02.8 Проведение обследования пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  Р3 - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по   |     |        | J and I I   |
| Р2 - Мурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме. Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме. Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р2 - Турикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р3 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р4 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р5 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р6 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р7 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р8 - Турикулярные точки перечислены правильно полном объеме. Р9 - Турикулярные точки перечислены с ошибками.   | В   | 4      | *   |
| Р2 - Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме. Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка). Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме. Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002 Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Ф С/02.8 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по   | Э   | -      | Используют точки каналов: толстой кишки (GI-4), желудка (E-20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (TR-6), желчного пузыря (VB-24),  |
| Р1 - Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме Р0 - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме. Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по   | P2  | -      |   |
| РО - Каналы и их точки перечислены неверно.  В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - ОО2  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Ф С/02.8 Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по  |     | _      | <u> </u>  |
| В 5 Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемы в лечении данной патологии.  Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).  Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по  |     | _      |   |
| роверение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями  В суроверение обследования пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  В суровернутые ответы на вопросы  В объеме.  В суроверние обследования пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  В суровернутые ответы на вопросы  В объемение обследования пациентам с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  В объемение обследования пациентам с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерания пациентам с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерания пациентам с заболеваниями и (или) состояниями состояниями состояниями пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  | 10  |        | Transaction in the first report in section.   |
| стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).      Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.      Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.      Аурикулярные точки перечислены с ошибками.      Аурикулярные точки перечислены с ошибками.      Ознакомьтесь с ситуациентам с заболеваниями и (или) состояниями      Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы      Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по   | В   | 5      |   |
| Р2 - Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ  РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по  | Э   | -      | стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86  |
| Р1 - Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме. Р0 - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по  | P2  | -      |   |
| РО - Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  Н - 002  Ф C/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по   |     | -      | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном   |
| Н       -       002         Ф       C/01.8       Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии         Ф       C/02.8       Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями         И       -       ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ         №       Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по   | P() | _      |   |
| Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по   |     |        |   |
| Ф С/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по   | н   | _      | 002   |
| Ф С/01.8 состояниями с целью назначения рефлексотерапии  Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по   | 11  |        |   |
| Ф       C/02.8       состояниями         I       ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ         V       Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по  | Φ   | C/01.8 | состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |
| РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ           Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по  | Φ   | C/02.8 | 1 1 1   |
| РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ           Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по  |     |        |   |
|  | И   | -      |   |
|  | У   | -      | 7 1   |

|      |   | Жалобы: слабость, раздражительность, головные боли, снижение    |
|------|---|---|
|      |   | внимания, нарушение сна.  |
|      |   | внимания, нарушение сна.  |
|      |   | Парацианита асмарум за за нами рафизисатараним (ДТ), в намизи   |
| В    | 1 | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной       |
|      |   | клинической ситуации.   |
| 2    |   | Задачи рефлексотерапии: оказать гипотензивное,                  |
| Э    | - | иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое,         |
| 70.0 |   | седативное действие.  |
| P2   | - | Задачи перечислены в полном объеме.                             |
| P1   | - | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).               |
| P0   | - | Задачи перечислены неверно.                                     |
|      |   |   |
| В    | 2 | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,    |
| ь    | 2 | используемые в лечении денного заболевания.                     |
|      |   | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию -            |
|      |   | иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный     |
|      |   | массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок,        |
| 2    |   | гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ)   |
| Э    | - | электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.;           |
|      |   | аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный       |
|      |   | массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ),                    |
|      |   | электрорефлексотерапия.   |
| P2   | - | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме                |
| P1   | - | Методы РТ перечислены в неполном объеме                         |
| P0   | _ | Методы РТ перечислены неправильно                               |
|      |   |   |
|      |   | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:       |
|      |   | скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от |
|      |   | протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек,            |
| В    | 3 | используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от    |
|      | J | способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе,       |
|      |   | минимальное время назначения повторного курса, минимальное      |
|      |   | количество курсов РТ за год.                                    |
|      |   | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со         |
|      |   | скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до         |
|      |   | появления предусмотренных ощущений, направление иглы против     |
|      |   | хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена,     |
|      |   | используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.           |
|      |   | К концу курса, при нормализации АД, сна, улучшения настроения,  |
| Э    | _ | переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней           |
| ,    |   | скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до           |
|      |   | появления предусмотренную или меньшую глуонну, до               |
|      |   | перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия        |
|      |   | вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.             |
|      |   | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1- |
|      |   | 2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).           |
| P2   |   |   |
|      | - | Способы воздействия указаны верно и подробно.                   |
| P1   | - | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.             |
| P0   | - | Способы воздействия указаны неверно.                            |
|      |   |   |

| В  | 4      | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.   |
|----|--------|---|
| Э  | -      | Используют точки каналов: <u>желудка</u> (Е-36), <u>толстого кишечника</u> (GI-11), <u>селезенки—поджелудочной железы</u> (RP-6), <u>сердца</u> (С-7), <u>перикарда</u> (МС-6,7), <u>мочевого пузыря</u> (V-15,25), <u>желчного пузыря</u> (VB-20,21), <u>печени</u> (F-13), <u>переднесрединного</u> (J-14,17), <u>заднесрединного</u> (T-14,20,24). |
| P2 | -      | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  |
| P1 | -      | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме  |
| P0 | -      | Каналы и их точки перечислены неверно.  |
|    |        |   |
| В  | 5      | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.   |
| Э  | -      | Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 13 (надпочечник), 19 (гипертония), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэеь), 59 (снижвющая артериальное даление), 72 <sup>1</sup> (завиток 1), 78 (верхушка уха), 105 (снижающая артериальное давление, вторая)                               |
| P2 | -      | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.   |
| P1 | -      | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.   |
| P0 | -      | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |
| Н  | -      | 003   |
| Φ  | C/01.8 | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |
| Φ  | C/02.8 | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями  |
| И  | -      | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ<br>РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ   |
| У  | -      | Пациент 46 лет. Д-3: Ожирение III степени алиментарно-<br>конституциональное, андроидный тип с развернутой<br>симптоматикой метаболического синдрома.<br>Жалобы: избыточный вес, одышка при физической нагрузке,<br>быстрая утомляемость, раздражительность.  |
|    |        |   |
| В  | 1      | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.   |
| Э  | -      | Задачи рефлексотерапии: липолитическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.  |
| P2 | -      | Задачи перечислены в полном объеме.   |
| P1 | -      | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).   |
| P0 | =      | Задачи перечислены неверно.   |
| В  | 2      | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.  |

|    |   | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию -   |
|----|---|--|
|    |   | иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный  |
|    |   | массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок,   |
| Э  |   | гирудотера-пия, прогревание биологических активных точек   |
| 9  | - | (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.;  |
|    |   | аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный  |
|    |   | массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ),   |
|    |   | электрорефлексотерапия.  |
| P2 | _ | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме   |
| P1 | _ | Методы РТ перечислены в неполном объеме  |
| PO | _ | Методы РТ перечислены неправильно  |
| 10 |   | тистоды т т пере пислены непривильно   |
|    |   | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:  |
|    |   | 1 ,  |
|    |   | скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от  |
| D  | 2 | протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек,   |
| В  | 3 | используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от   |
|    |   | способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе,  |
|    |   | минимальное время назначения повторного курса, минимальное   |
|    |   | количество курсов РТ за год.   |
|    |   | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со  |
|    |   | скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до  |
|    |   | появления предусмотренных ощущений, направление иглы против  |
| Э  | - | хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена,  |
|    |   | используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  |
|    |   | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-  |
|    |   | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  |
| P2 | - | Способы воздействия указаны верно и подробно.  |
| P1 | - | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  |
| P0 | - | Способы воздействия указаны неверно.   |
|    |   |  |
| D  | 4 | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,  |
| В  | 4 | используемы в лечении данной патологии.  |
|    |   | Используют точки каналов: <u>переднесрединного</u> (J-4), <u>печени</u> (F-  |
| n  | - | 13), мочевого пузыря (V-20, 23, 43); легких (Р-7), селезенки-  |
| Э  |   | <u>поджелудочной железы</u> (RP-1, 2, 3, 4, 6); <u>почек</u> (R-3, 6); <u>«трех</u>  |
|    |   | <u>обогревателей»</u> (TR-4, 5), <u>желудка</u> (E-33, 36, 45), <u>перикарда</u> (MC6),  |
| P2 | _ | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.   |
| P1 | _ | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме   |
| PO | _ | Каналы и их точки перечислены неверно.   |
|    |   | and the same of the same and th |
|    |   | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4),  |
| В  | 5 | используемы в лечении данной патологии.  |
|    |   | Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят  |
|    | - | стимуляцию точек ушной раковины: 17 (жажда), 18 (голода), 22   |
| Э  |   | (железы внутренней секреции), 26а (придаток мозга), 51   |
| 9  |   |  |
|    |   | (симпатическая), 55 (шэнь-мэнь), 95 (почка), .96 (поджелудочная  |
| D2 |   | жедеза), 97 (печень), 122 (панкреатит).  |
| P2 | - | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  |
| P1 | - | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном  |
|    |   | объеме.  |
|    |   |  |

| P0       | -      | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |
|----------|--------|---|
| **       |        |   |
| Н        | -      | 004   |
| Φ        | C/01.8 | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |
|          |        | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)  |
| Φ        | C/02.8 | состояниями   |
|          |        |   |
| И        | -      | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ<br>РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ   |
| У -      |        | Пациент 65 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя люмбалгия, мышечно-тонические проявления, выраженный болевой синдром. Жалобы: боли в пояснице слева, усиливающиеся при движении, ограничение движений в поясничном отделе позвоночника,   |
|          |        | слабость, раздражительность, плохой сон.  |
| $\vdash$ |        | Пополукатура осугорукую за также да та |
| В        | 1      | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.   |
|          |        | Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое,  |
| Э        | _      | спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее,   |
|          |        | нейротрофическое, седативное действие.  |
| P2       | _      | Задачи перечислены в полном объеме.   |
| P1       | -      | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).   |
| P0       | -      | Задачи перечислены неверно.   |
|          |        |   |
| В        | 2      | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.  |
| Э        | -      | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия и др  |
| P2       | _      | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме  |
| P1       | _      | Методы РТ перечислены в неполном объеме   |
| P0       | -      | Методы РТ перечислены неправильно   |
|          |        |   |
| В        | 3      | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.   |
| Э        | -      | При выраженной боли – I вариант тормозного метода: иглы вводят медленно, глубоко, до появления выраженных предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале,  |

|     |        | выраженная зона гиперемии вокруг иглы, используют 2-3 БАТ,  |
|-----|--------|---|
|     |        | время постановки игл 40 – 60 минут и более.   |
|     |        | При некотором стихании боли используют II вариант тормозного  |
|     |        | метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на  |
|     |        | предусмотренную глубину, до появления предусмотренных   |
|     |        | ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона   |
|     |        | гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время   |
|     |        | постановки игл до 30 минут.   |
|     |        | При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на                 |
|     |        | предусмотренную или меньшую глубину, до появления   |
|     |        | предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно   |
|     |        | ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ,   |
|     |        | время постановки игл 25 мин.  |
|     |        | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-   |
|     |        | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.   |
| P2  | -      | Способы воздействия указаны верно и подробно.   |
| P1  | -      | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.   |
| P0  | -      | Способы воздействия указаны неверно.  |
|     |        | J 3334  |
|     |        | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,   |
| В   | 4      | используемы в лечении данной патологии.   |
|     |        | Используют точки каналов: мочевого пузыря (V-22, 23, 25, 27, 31,  |
|     |        | 32, 33, 34, 36, 40, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 67); желчного пузыря (VB-   |
| Э   |        | 30, 34, 39); желудка (Е-36, 41, 44); заднесрединного (Т-2, 4); тонкой   |
| 9   | -      | кишки (IG-3), толстой кишки (GI-4). Для выполнения правила  |
|     |        | «верх—низ», а по другим теориям, чтобы «блокировать» каналы,  |
|     |        | используют точки V-11, 41, 60; T-14.  |
| P2  | -      | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  |
| P1  | -      | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме  |
| P0  | -      | Каналы и их точки перечислены неверно.  |
|     |        |   |
| В   | 5      | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4),   |
|     |        | используемы в лечении данной патологии.   |
|     |        | Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят   |
| Э   |        | стимуляцию точек ушной раковины: 40 (поясничный отдел   |
| ] ] | -      | позвлночника), 38 (крестцовый отдел позвоночника), 54 (люмбалгия), 53 (ягодица), 29 (затылок). На ухе можно оставлять |
|     |        | (люмоалгия), 33 (ягодица), 29 (затылок). гла ухе можно оставлять микроиглы на 2—3 дня.                                |
| P2  |        | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.   |
|     |        | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном    |
| P1  | -      | объеме.   |
| P0  |        | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |
| 10  |        | 11) pinkympinko 10 ikii nepe inesteliki e omnokumi.   |
| Н   | _      | 005   |
|     |        | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)   |
| Φ   | C/01.8 | состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |
|     |        | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)  |
| Φ   | C/02.8 | состояниями.  |
|     |        |   |
|     |        | L   |

| И  | - | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ<br>РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  |
|----|---|--|
|    |   | Пациент 47 лет. Д-3: Вертеброгенная левосторонняя  |
|    |   |  |
|    |   | цервикобрахиалгия, мышечно-тонические проявления, умеренно   |
| У  | - | выраженный болевой синдром.  |
|    |   | Жалобы на боль в шейном отделе позвоночника слева с  |
|    |   | иррадиацией в левую руку. Ограничение движений в шейном  |
|    |   | отделе позвоночника. Раздражительность, бессонница.  |
|    |   |  |
| В  | 1 | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной  |
|    |   | клинической ситуации.  |
|    |   | Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое,   |
| Э  | - | спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее,  |
|    |   | нейротрофическое, седативное действие.   |
| P2 | - | Задачи перечислены в полном объеме.  |
| P1 | - | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).  |
| P0 | - | Задачи перечислены неверно.  |
|    |   |  |
|    |   | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,   |
| В  | 2 | используемые в лечении денного заболевания.  |
|    |   | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию -   |
|    |   | иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный  |
|    |   | массаж, цуботерапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок,  |
|    |   |  |
| Э  |   | гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ)  |
| 9  | - | электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.;  |
|    |   | аурикулярную РТ - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный  |
|    |   | массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ),   |
|    |   | электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую и по   |
| D0 |   | Ямомото) и др.   |
| P2 | - | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме   |
| P1 | - | Методы РТ перечислены в неполном объеме  |
| P0 | - | Методы РТ перечислены неправильно  |
|    |   |  |
|    |   | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой:  |
|    |   | скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от  |
|    |   | протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек,   |
| В  | 3 | используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от   |
|    |   | способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе,  |
|    |   | минимальное время назначения повторного курса, минимальное   |
|    |   | количество курсов РТ за год.   |
|    |   | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со  |
|    |   | скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до  |
|    | - | появления предусмотренных ощущений, направление иглы против  |
|    |   | хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена,  |
| Э  |   | используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.  |
|    |   | При купировании болевого синдрома переходят на   |
|    |   | гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на   |
|    |   | предусмотренную или меньшую глубину, до появления  |
|    |   | предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно  |
|    |   | mp-morpoint out indicate in the manipulation in the indicate i |

|          |   | ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ,                       |
|----------|---|---|
|          |   | время постановки игл 25 мин.  |
|          |   | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-                       |
|          |   | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.   |
| P2       | - | Способы воздействия указаны верно и подробно.   |
| P1       | - | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.                                   |
| P0       | - | Способы воздействия указаны неверно.  |
|          |   |   |
| В        | 4 | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,                         |
| Б        | 4 | используемы в лечении данной патологии.   |
|          |   | Используют точки каналов: мочевого пузыря (V-8, 10, 11, 41);                          |
| Э        |   | заднесрединного (T-14, 16, 17, 20); желчного пузыря (VB-19, 20, 21,                   |
| 9        | - | 39); <u>толстой кишки</u> (GI-4, 11); <u>тонкой кишки</u> (IG-3, 4, 11); <u>«трех</u> |
|          |   | <u>обогревателей»</u> (TR-5, 8); <u>перикарда</u> (MC-7); <u>легких (</u> P-7         |
| P2       | - | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.                                  |
| P1       | - | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме                                |
| P0       | - | Каналы и их точки перечислены неверно.  |
|          |   |   |
| В        | 5 | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3),                                 |
| Б        | 3 | используемы в лечении данной патологии.   |
| Э        |   | Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят                                     |
| <i>J</i> | - | стимуляцию точек ушной раковины: 55, 29, 37, 41, 13, 63, 121.                         |
| P2       | - | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.                             |
| P1       |   | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном                               |
|          | _ | объеме.   |
| P0       | - | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |
|          |   |   |
|          |   |   |

#### 5. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

- 5.1. Перечень заданий к зачету, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности: кейс-задания.
- 5.1.1. Кейс задания зачету по практике «Производственная (клиническая) практика 2 (Обучающий симуляционный курс (специальные профессиональные умения и навыки)» для оценки компетенций ПК 1, ПК 2, ПК-3,ПК 4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12

| Н | -      | 001   |
|---|--------|---|
| Φ | C/01.8 | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |
|   |        | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)  |
| Φ | C/02.8 | состояниями.  |
|   |        |   |
| И | -      | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-<br>ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ   |
| У | -      | Пациент 27 лет. Д-3: Вегетососудистая дистония по смешанному типу, средней степени тяжести, с нарушением ритма по типу желудочковой экстрасистолии, НК 0. Жалобы на периодически возникающую после стрессовых ситуаций головную боль, периодически подъемы АД до 130/80-140/80, |

|  |   | боли в сердце в покое, чувство «замирания в сердце», раздражи-   |  |
|--|---|--|--|
|  |   | тельность, нарушение сна   |  |
|  |   |  |  |
| В  | 1 | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной кли-   |  |
|  | 1 | нической ситуации.   |  |
| трофическое, спазмолитическое, седативное дейс |   | Задачи РТ: оказать гипотензивное, иммуномодулирующее, нейро-   |  |
|  |   | трофическое, спазмолитическое, седативное действие   |  |
| P2   | - | Задачи перечислены в полном объеме.  |  |
| P1   | - | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).  |  |
| P0   | - | Задачи перечислены неверно.  |  |
|  |   |  |  |
| D  | 2 | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,   |  |
| В  | 2 | используемые в лечении данного заболевания.  |  |
|  |   | В лечении используют: корпоральную рефлексотерапию - иглоте-   |  |
|  |   | рапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж,  |  |
|  |   | цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотера-   |  |
| Э  | _ | пия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-ре-  |  |
|  | _ | флексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; аурикулярную РТ -  |  |
|  |   | иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание  |  |
|  |   | аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия, скальптера-   |  |
|  |   | пию (классическую и по Ямомото) и др.  |  |
| P2   | - | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме   |  |
| P1   | - | Методы РТ перечислены в неполном объеме  |  |
| P0   | - | Методы РТ перечислены неправильно  |  |
|  |   |  |  |
|  |   | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: ско-   |  |
|  |   | рость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от про-  |  |
| _  |   | текания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в   |  |
| В  | 3 | процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите   |  |
|  |   | минимальное количество процедур в курсе, минимальное время   |  |
|  |   | назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ  |  |
|  |   | за год.  |  |
|  | - | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоро-   |  |
|  |   | стью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления   |  |
|  |   | предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют |  |
|  |   | 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.   |  |
|  |   | При купировании болевого синдрома, нормализации давления,  |  |
| Э  |   | эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод:   |  |
|  |   | вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую  |  |
|  |   | глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направ-   |  |
|  |   | лена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия  |  |
|  |   | вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.  |  |
|  |   | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-  |  |
|  |   | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.  |  |
| P2   | - | Способы воздействия указаны верно и подробно.  |  |
| P1   | - | , i i  |  |
| P0   | - |  |  |
|  | ì | <u> </u>   |  |
| P1   | - | Способы воздействия указаны верно, но не полностью. Способы воздействия указаны неверно.                                 |  |
|  |   |  |  |

| В 4      |        | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,  |
|----------|--------|--|
|          |        | используемы в лечении данной патологии.  |
|          |        | Используют точки каналов: желудка (Е-36), толстого кишечника   |
|          |        | перикарда (МС-6,7), мочевого пузыря (V-15,25), желчного пузыря   |
| Э        | -      | <u>динном</u> (Т-14,20,24), внемеридианные (ТВМ-9,57), «новая» точка   |
|          |        | (HT-62).   |
|          |        |  |
|          |        |  |
| P2       | -      | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.   |
| P1       | -      | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме   |
| P0       | -      | Каналы и их точки перечислены неверно.   |
|          |        |  |
| Ъ        |        | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), исполь-  |
| В        | 5      | зуемы в лечении данной патологии   |
|          |        | В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19,   |
| Э        | -      | The state of the s |
| P2       | -      | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  |
|          |        | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объ-   |
| P1       | -      | eme.   |
| PO       |        | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.   |
|          |        |  |
| Н        |        | 002  |
|          |        | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-  |
| Φ        | C/01.8 | стояниями с целью назначения рефлексотерапии   |
|          |        | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)   |
| Φ        | C/02.8 | состояниями.   |
|          |        | состояниями.   |
|          |        | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-   |
| И        | -      | ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  |
|          |        | Пациент 50 лет. Д-3: Гипертоническая болезнь І. АГ.1. Риск 2.  |
|          |        | Жалобы на головную боль, раздражительность, нарушение сна.   |
| У        | -      |  |
|          |        | Постоянные подъемы АД в течении года до 150/90. На ЭКГ, УЗИ  |
|          |        | органов брюшной полости и почек органических изменений нет   |
| $\vdash$ |        | Паказууатуу а аугаауу а таатаа (рт)  |
| В        | 1      | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной кли-   |
|          |        | нической ситуации.   |
| Э        | -      | Задачи РТ: гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофи-  |
| 7.0      |        | ческое, спазмолитическое, седативное действие.   |
| P2       |        | Задачи перечислены в полном объеме.  |
| P1       | -      | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).  |
| P0       | -      | Задачи перечислены неверно.  |
| oxed     |        |  |
| В        | 2      | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,   |
|          | 4      | используемые в лечении данного заболевания.  |
| [        |        | Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж,  |
|          | -      | точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микро-   |
| Э        |        | иглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ   |
|          |        | и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точеч-  |
|          |        | ный массаж, прогревание АТ).   |
|          |        |  |

| P2 | -  | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме   |  |  |
|----|--|--|--|--|
| P1 | -  | Методы РТ перечислены в неполном объеме  |  |  |
| P0 | -  | Методы РТ перечислены неправильно  |  |  |
|    |  |  |  |  |
| В  | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) и рость, глубина введения игл, постановку игл в зависимом текания энергии в канале, количество (БАТ) точек, исполя процедуре, время воздействия в зависимости от способа минимальное количество процедур в курсе, минимальназначения повторного курса, минимальное количество за год. |  |  |  |
| Э  | -  | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При нормализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1- |  |  |
| P2 | _  | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.<br>Способы воздействия указаны верно и подробно.   |  |  |
| P1 | _  | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  |  |  |
| PO | _  | Способы воздействия указаны неверно.   |  |  |
|    |  |  |  |  |
| В  | 4  | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.  |  |  |
| Э  | -  | Используют точки каналов: <u>желудка</u> (Е-36), <u>толстого кишечника перикарда</u> (МС-6,7), <u>мочевого пузыря</u> (V-15,25), <u>желчного пузыря динном</u> (Т-14,20,24), <u>внемеридианные</u> (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62).  |  |  |
| P2 | -  | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.   |  |  |
| P1 | -  | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме   |  |  |
| P0 | -  | Каналы и их точки перечислены неверно.   |  |  |
|    |  | ·  |  |  |
| В  | 5  | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии   |  |  |
| Э  | -  | В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19,   |  |  |
| P2 | -  | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  |  |  |
| P1 | -  | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.  |  |  |
| PO | -  | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.   |  |  |
|    |  | J1 J. F  |  |  |
| Н  | -  | 003  |  |  |

| Ф  | C/01 0 | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-   |  |
|----|--------|---|--|
| Φ  | C/01.8 | стояниями с целью назначения рефлексотерапии  |  |
| Φ  | C/02.8 | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.   |  |
|    |        |   |  |
| И  | -      | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-<br>ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ   |  |
| У  | -      | Пациент 52 лет. Д-3: ИБС: стабильная стенокардия напряжения. ФК I, НК 0. Жалобы на боли в сердце при физической нагрузке, головная боль, раздражительность, плохой сон.   |  |
|    |        |   |  |
| В  | 1      | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.   |  |
| Э  | -      | Задачи РТ: анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, липолитическое действие.  |  |
| P2 | -      | Задачи перечислены в полном объеме.   |  |
| P1 | -      | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).   |  |
| P0 | -      | Задачи перечислены неверно.   |  |
|    |        | · ·   |  |
| В  | 2      | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.  |  |
| Э  | -      | Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаточечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микр иглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БА и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точеный массаж, прогревание АТ).   |  |
| P2 | _      | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме  |  |
| P1 | _      | Методы РТ перечислены в неполном объеме   |  |
| PO | _      | Методы РТ перечислены неправильно   |  |
| 10 |        | тогоды т тырь тольш поприыты  |  |
| В  | 3      | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.   |  |
| Э  | -      | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. |  |

|           |          | По учите от 10 утомотите Портовумуй импер можему мерсуламоту мето 1                                |  |  |
|-----------|----------|--|--|--|
|           |          | На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.   |  |  |
| P2        |          | Способы воздействия указаны верно и подробно.  |  |  |
| P1        |          | Способы воздействия указаны верно и подрооно.  Способы воздействия указаны верно, но не полностью. |  |  |
| P0        | <u>-</u> |  |  |  |
| 10        |          | Способы воздействия указаны неверно.   |  |  |
| IRI 4 I - |          | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки,                                      |  |  |
|           |          | используемы в лечении данной патологии.  |  |  |
|           |          | Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС-                                    |  |  |
|           |          | 2, 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (RP-4); толстой   |  |  |
| Э         | -        | кишки (GI-4, 11); желудка (Е-36); переднесрединного (J-14, 17);                                    |  |  |
|           |          | мочевого пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемери-                                      |  |  |
|           |          | дианные (ТВМ-59, 132); «новая» точка (HT-28).  |  |  |
| P2        | -        | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.   |  |  |
| P1        | -        | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме   |  |  |
| P0        | -        | Каналы и их точки перечислены неверно.   |  |  |
|           |          |  |  |  |
| В         | 5        | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), исполь-                                      |  |  |
| В         | 5        | зуемы в лечении данной патологии   |  |  |
| Э         | -        |  |  |  |
| P2        | -        | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.  |  |  |
| D1        |          | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объ-                                       |  |  |
| P1        | -        | еме.   |  |  |
| P0        | -        | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.   |  |  |
|           |          |  |  |  |
| Н         | -        | 004  |  |  |
| Φ         | C/01.8   | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) со-                                      |  |  |
| Ψ         | C/01.8   | стояниями с целью назначения рефлексотерапии   |  |  |
| Φ         | C/02.8   | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или)                                       |  |  |
| Ψ         | C/02.0   | состояниями.   |  |  |
|           |          |  |  |  |
| И         | _        | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-   |  |  |
| 37        |          | тые ответы на вопросы  |  |  |
| У         |          |  |  |  |
|           |          | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной кли-                                     |  |  |
| В         | 1        | нической ситуации.   |  |  |
| Э         |          | Задачи РТ:.  |  |  |
| P2        | <u>-</u> |  |  |  |
| P1        |          | Задачи перечислены в полном объеме.  |  |  |
| PO        |          | Задачи перечислены не в полном объеме (частично). Задачи перечислены неверно.                      |  |  |
| 10        | -        | радали перелислены неверно.  |  |  |
|           |          | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии,                                       |  |  |
| В         | 2        | используемые в лечении данного заболевания.  |  |  |
|           |          | Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж,  |  |  |
|           | -        | точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микро-   |  |  |
| Э         |          | иглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ                                       |  |  |
|           |          | и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точеч-                                    |  |  |
|           |          | ный массаж, прогревание АТ).   |  |  |
|           |          | 1 " 1 F T T " " 1 /"   |  |  |

| P2 | _  | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме  |  |  |
|----|--|---|--|--|
| P1 | _  | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме Методы РТ перечислены в неполном объеме  |  |  |
| P0 |  | Методы РТ перечислены неправильно   |  |  |
| 10 |  |   |  |  |
| В  | 3  | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: с рость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от п текания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемо процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажиминимальное количество процедур в курсе, минимальное вреназначения повторного курса, минимальное количество курсов за год.   |  |  |
| Э  | -  | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1- |  |  |
| P2 |  | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.<br>Способы воздействия указаны верно и подробно.  |  |  |
| P1 | <u>-</u>                                 | Способы воздействия указаны верно и подробно.  Способы воздействия указаны верно, но не полностью.  |  |  |
| P0 |  | Способы воздействия указаны неверно.  |  |  |
| 10 |  | спосооы возденствия указаны неверно.  |  |  |
| В  | 4  | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.   |  |  |
| Э  | -  |   |  |  |
| P2 | -  | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  |  |  |
| P1 | -  | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме  |  |  |
| P0 | - Каналы и их точки перечислены неверно. |   |  |  |
| В  | 5  | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии  |  |  |
| Э  | -  | В области ушной раковины стимулируют следующие точки из перечисленных: 13, 19, 34, 51, 59, 72', 78, 100, 104.   |  |  |
| P2 | -  | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.   |  |  |
| P1 | -  | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.   |  |  |
| P0 | -  | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |  |  |
| Н  | _  | 005   |  |  |
| Ф  | C/01.8                                   | Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии  |  |  |
| Ф  | C/02.8                                   | Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.   |  |  |
|    |  |   |  |  |

|    |   | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-  |
|----|---|---|
| И  | - | ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ   |
| У  | - | Задача. Пациент 56 лет. Д-3: Хроническая обструктивная болезнь легких, средней степени тяжести (стадия II), фаза стихающего обострения. ДН I. Жалобы на кашель с умеренным количеством светлой мокроты, затруднение выдоха, одышку при повышенной физической нагрузке.  |
|    |   |   |
| В  | 1 | Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.   |
| Э  | - | Задачи РТ: оказать бронхолитическое, муколитическое, противовоспалительное, анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, действие.  |
| P2 | - | Задачи перечислены в полном объеме.   |
| P1 | - | Задачи перечислены не в полном объеме (частично).   |
| P0 | - | Задачи перечислены неверно.   |
|    |   | 1   |
| В  | 2 | Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.  |
| Э  | - | Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микро-иглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).   |
| P2 | _ | Методы РТ перечислены правильно в должном объеме  |
| P1 | - | Методы РТ перечислены в неполном объеме   |
| P0 | - | Методы РТ перечислены неправильно   |
|    |   | •   |
| В  | 3 | Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.   |
| Э  | - | Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании обструктивного синдрома, кашля нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1- |
|    |   | 17 месяца Минимум 4 купса РГ в гол  |
| P2 |   | 2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.<br>Способы воздействия указаны верно и подробно.  |

| P1 | 1 | Способы воздействия указаны верно, но не полностью.   |  |
|----|---|---|--|
| P0 | - | Способы воздействия указаны неверно.  |  |
|    |   |   |  |
| В  | 4 | Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.   |  |
| Э  | ı | Используют точки каналов: легких (P-1, 2, 5, 7, 9); толстой кишки лезы (RP-6), мочевого пузыря (V-11, 12, 13, 42, 43); почек (R-2,3,6,27); «трех обогревателей» (TR-5), желчного пузыря (VB-20), печени (F-14), переднесрединном (J-6, 17, 21, 22, 23); внемеридианные (TBM-30, 32, 33); «новые» точки (HT-45, 50). |  |
| P2 | ı | Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.  |  |
| P1 | - | Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме  |  |
| P0 | - | Каналы и их точки перечислены неверно.  |  |
| В  | 5 | Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии  |  |
| Э  | - | В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках: 13, 15,   |  |
| P2 | - | Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.   |  |
| P1 | - | Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.   |  |
| P0 | - | Аурикулярные точки перечислены с ошибками.  |  |
|    |   |   |  |

## **6. Критерии оценивания результатов обучения** Для зачета

| Dooryer more a of servery              | Критерии оценивания  |   |
|--|--|---|
| Результаты обучения                    | Не зачтено   | Зачтено   |
|  |  | Уровень знаний в объеме,  |
|  | Уровень знаний ниже  | соответствующем программе   |
| Полнота знаний                         | минимальных требований.  | подготовки. Могут быть  |
|  | Имели место грубые ошибки.   | допущены несущественные   |
|  |  | ошибки  |
|  | При решении стандартных  | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые  |
| Наличие умений                         | задач не продемонстрированы  | задачи, выполнены все задания.  |
|  | основные умения. Имели место   | Могут быть допущены   |
|  | грубые ошибки.   | несущественные ошибки.  |
| Наличие навыков<br>(владение опытом)   | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.               | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач. Могут быть допущены несущественные ошибки. |
| Мотивация<br>(личностное<br>отношение) | Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют | Проявляется учебная активность и мотивация, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи.       |

|                  | Компетенция в полной мере не | Сформированность             |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  | сформирована. Имеющихся      | компетенции соответствует    |
| Характеристика   | знаний, умений, навыков      | требованиям. Имеющихся       |
| сформированности | недостаточно для решения     | знаний, умений, навыков и    |
| компетенции      | практических                 | мотивации в целом достаточно |
|                  | (профессиональных) задач.    | для решения практических     |
|                  | Требуется повторное обучение | (профессиональных) задач.    |
| Уровень          |                              |                              |
| сформированности | Низкий                       | Средний/высокий              |
| компетенций      |                              |                              |

#### Для тестирования:

Оценка «5» (Отлично) - баллов (100-90%)

Оценка «4» (Хорошо) - балла (89-80%)

Оценка «3» (Удовлетворительно) - балла (79-70%)

Менее 70% – Неудовлетворительно – Оценка «2»

#### Разработчик:

- 1. Белова Анна Наумовна д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской реабилитации
- 2. Беспалова Анна Владимировна к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации.
- 3. Исраелян Юлия Александровна к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации
- 4. Карпова Жанна Юрьевна -к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации